

البكالوريا بين يديك

BAC

محمد صابور

# الأعداد المركبة

100 تمرين تطبيقي

البرهان الجديد

Scanned by : Mekkaoui Ayoub  
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr



إهداء لا بُدّ منه ...

إلى الأخ " سرحات " .  
لا تترك تمريناً في هذا الكُتَيْب دونَ حَلِّه!  
رجائي لك بالتّوفيق الكثير..

أيّوب.

## الأعداد المركبة

(البرنامج الجديد)

100 تمرين تطبيقي

شعبة : علوم تجريبية  
شعبة : رياضيات  
شعبة : تقني رياضي

## حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

رقم الإيداع القانوني : 3375- 2007

ردمك : 4- 1864 - 0 - 9947 - 978 - ISBN :

طبع بمطبعة ع - بن - برج الكيفان -  
الجزائر

## المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .  
أما بعد ، خير ما أبدأ به في مقدمة هذا الكتيب هو كلام الله و حديث رسوله الكريم . إذ يقول الله تعالى في محكم تنزيله " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  
" العلم فريضة على كل مسلم "  
تواصل السلسلة المعروفة بـ : " البكالوريا بين يديك " صدورها إذ تقدم لكم أبنائي الطلبة كتيب في البرنامج الجديد عنوانه " الامتحان المرعبة "  
يحتوي هذا الكتيب على 100 تمرين تطبيقي متنوعة منها المحلولة حلا مفصلا وأخرى مرفقة بالنتائج ليقوم بها الطالب معلوماته وتمارين مقترحة للحل .  
إن معظم التمارين الموجودة هي " نموذج بكالوريا " وأخيرا أتمنى لكل القراء من طلبتنا الأعزاء التوفيق ، كما أرجو من زملائي أساتذة الرياضيات أن يمدوني بملاحظاتهم البناءة لتحسين محتوى هذا الكتيب .

الأستاذ : محمد صابور



# الإهداء

إلى والدي الكريمين .

إلى رجال التعليم المخلصين في واجبهم  
إلى أبنائي الطلبة متمنيا لهم النجاح في

شهادة البكالوريا .

أهدي هذا الكتيب المتواضع .

الأستاذ : محمد صابور

## الأعداد المركبة

- الشكل الحبري:

$z = x + iy$  و  $z' = x' + iy'$  عدنان مركبان .

$z = 0$  معناه  $(x = 0 \text{ و } y = 0)$

$z = z'$  معناه  $(x = x' \text{ و } y = y')$

$$z + z' = (x + x') + (y + y')i$$

$$z \times z' = (xx' - yy') + (xy' + yx')i$$

$$z + \bar{z} = 2x \quad , \quad \bar{z} = x - iy$$

$$z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2 \quad , \quad z - \bar{z} = 2yi$$

$z = \bar{z}$  حقيقي معناه تخيلي  $z$  معدوم يكافئ

$z$  تخيلي معناه حقيقي  $z$  معدوم يكافئ  $z + \bar{z} = 0$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad , \quad \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'} \quad , \quad \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$$


- التمثيل الهندسي لعدد مركب :

$z = x + iy$  عدد مركب غير معدوم . النقطة  $M(x; y)$

تسمى صورة العدد المركب  $z$  . العدد المركب  $z$  يسمى

لاحقة  $M$  ونكتب  $M(z)$  . الشعاع  $\overline{OM}$  هو صورة العدد

المركب  $z$  .





### - طويلة عدد مركب :

$z$  عدد مركب حيث  $z = x + iy$ . نسمي طويلة  $z$  العدد الحقيقي الموجب  $\sqrt{x^2 + y^2}$  ، نرسم لطويلة  $z$  ب:  $|z|$  .  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

خواص:

$$|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'| , \quad \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} , \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$|z^n| = |z|^n , \quad |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

### - عمدة عدد مركب غير معدوم :

تعريف :

$z$  عدد مركب غير معدوم ، صورته  $M$  . نسمي عمدة العدد المركب  $z$  كل قياس للزاوية  $(\vec{i}; \vec{OM})$  ورمزه  $\arg z$  .

خواص:

$$\arg \frac{1}{z} \equiv -\arg z [2\pi] , \quad \arg z \cdot z' \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$$

$$\arg \frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' [2\pi] , \quad \arg z^n \equiv n \times \arg z [2\pi]$$

$$\arg(-z) \equiv \pi + \arg z [2\pi] , \quad \arg \bar{z} \equiv -\arg z [2\pi]$$

### - الشكل المثلثي لعدد مركب :

كل عدد مركب  $z$  طويلته  $r$  وعمدته  $\theta$  يكتب على الشكل :  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  تسمى هذه الكتابة بالشكل المثلثي للعدد المركب  $z$  .

الانتقال من الشكل الجبري  $z = x + iy$  للعدد المركب إلى الشكل المثلثي يتم بمعرفة الطويلة  $r$  و العمدة  $\theta$  .

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{و المساوتين :}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{و} \quad \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{تعيينان العدد } \theta .$$

- الترميز :  $e^{i\theta}$

نصطلح أن نرسم للعدد المركب  $z = \cos \theta + i \sin \theta$  ب:  $z = e^{i\theta}$

من المساوتين :  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  .

و  $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$  نستنتج أن :

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) , \quad \cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$$

هاتين العلاقتين تسميان بقوانين "Euler" وتستعمل

خاصة في تحويل العبارات المثلثية إلى عبارات خطية .



## تمارين محلولة

### تمرين 01

أحسب مايلي: (1)  $(1+3i)(2-5i)$

(2)  $(1+3i)(-2+i) - (-3+i)(1+i)$

(3)  $(2-3i)^2 - i(1+3i)$

الحل

$$(1+3i)(2-5i) = 2 - 5i + 6i + 15 = \boxed{17+i} \quad (1)$$

$$(1+3i)(-2+i) - (-3+i)(1+i) = \quad (2)$$

$$(-2+i-6i-3) - (-3-3i+i-1) =$$

$$(-5-5i) - (-4-2i) = -5-5i+4+2i = \boxed{-1-3i}$$

$$(2-3i)^2 - i(1+3i) = (4-12i-9) - i+3 \quad (3)$$

$$= \boxed{-2-13i}$$

### تمرين 02

باستعمال الجداءات الشهيرة ، احسب ما يلي :

$$(1) \quad (1+i)^3 \quad (2) \quad (2-3i)(2+3i) \quad (3) \quad (2-i)^3$$

$$(4) \quad i(1+2i)^2 - (-1+i)^2$$

الحل

$$(1+i)^3 = 1^3 + 3i + 3i^2 + i^3 \quad (1)$$

$$= 1 + 3i - 3 - i = \boxed{-2+2i}$$



بالتوفيق إن شاء الله  
في البكالوريا

Scanned by : Mekkaoui Ayoub  
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr



$$\begin{aligned}
L_1 &= (1+2i-2i) \left[ (1+2i)^2 + 2i(1+2i) + (2i)^2 \right] \\
&= 1 \times (1+4i-4+2i-4-4) = \boxed{-11+6i} \\
L_2 &= (3+2i)^2 + (1+i)^2 = (3+2i)^2 - i^2(1+i)^2 \\
&= (3+2i)^2 - [i(1+i)]^2 = (3+2i)^2 - (-1+i)^2 \\
&= [(3+2i) - (-1+i)][(3+2i) + (-1+i)] \\
&= \boxed{(4+i)(2+3i)}
\end{aligned}$$

#### تمرين 04

1- أ) احسب  $i^8, i^7, i^6, i^5, i^4$ .

ب) استنتج حساب  $i^n (n \in \mathbb{N})$ .

2- احسب :  $(1+i)^{2002}, (1+i)^2$ .

#### الحل

$$i^4 = i^2 \times i^2 = (-1)(-1) = +1 \quad (1-1)$$

$$i^6 = i^4 \times i^2 = (+1)(-1) = -1, \quad i^5 = i^4 \times i = (+1)i = i$$

$$i^8 = i^4 \times i^4 = +1, \quad i^7 = i^6 \times i = (-1)i = -i$$

ب) نستنتج من الدراسة السابقة أنه إذا كان :  $n = 4k (k \in \mathbb{N})$

فإن :  $i^n = 1$  و إذا كان :  $n = 4k+1 (k \in \mathbb{N})$  فإن :  $i^n = i$

و إذا كان :  $n = 4k+2 (k \in \mathbb{N})$  فإن :  $i^n = -1$ .

$$(2-3i)(2+3i) = 2^2 - (3i)^2 \quad (2)$$

$$= 4 - 9i^2 = 4 + 9 = \boxed{13}$$

$$(2-i)^3 = 2^3 - 3(2)^2 i + 3(2)(i)^2 - i^3 \quad (3)$$

$$= 8 - 12i - 6 + i = \boxed{2-11i}$$

$$i(1+2i)^2 - (-1+i)^2 = \quad (4)$$

$$i(1+4i-4) - (1-2i-1) = i(-3+4i) + 2i$$

$$= \boxed{-4-i}$$

#### تمرين 03

اكتب العبارات الآتية على شكل جداء عاملين :

$$L_1 = (1+2i)^3 + 8i, \quad L = 4(2+i)^2 + 9$$

$$L_2 = (3+2i)^2 + (1+i)^2$$

#### الحل

$$L = 4(2+i)^2 + 9 = [2(2+i)]^2 - (3i)^2$$

$$= [2(2+i) - 3i][2(2+i) + 3i]$$

$$= \boxed{(4-i)(4+5i)}$$

$$L_1 = (1+2i)^3 + 8i = (1+2i)^3 - (2i)^3$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{ومنه :}$$



$$i^3 \times \frac{1-i}{1+i} = -i \times \frac{1-i}{1+i} = \frac{-1-i}{1+i} = -\frac{1+i}{1+i} = \boxed{-1}$$

**تمرين 06**  
أكتب على الشكل الجبري.

$$(1+i)^{32} - \frac{5i}{1+2i} \quad (3) \quad \frac{1}{1+\sqrt{2}-i} \quad (2) \quad \frac{1+i}{1-i} + \frac{2+i}{1+i} \quad (1)$$

الحل

$$\frac{1+i}{1-i} + \frac{2+i}{1+i} = \frac{(1+i)^2 + (2+i)(1-i)}{(1-i)(1+i)} = \boxed{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i} \quad (1)$$

$$\frac{1}{1+\sqrt{2}-i} = \frac{1+\sqrt{2}+i}{(1+\sqrt{2}-i)(1+\sqrt{2}+i)} \quad (2)$$

$$= \frac{1+\sqrt{2}+i}{(1+\sqrt{2})^2 + 1} = \boxed{\frac{1+\sqrt{2}}{4+2\sqrt{2}} + \frac{1}{4+2\sqrt{2}}i}$$

$$(1+i)^{32} - \frac{5i}{1+2i} = \left[(1+i)^2\right]^{16} - \frac{5i(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} \quad (3)$$

$$= (2i)^{16} - \frac{10+5i}{5} = 2^{16} \times (i^4)^4 - (2+i)$$

$$= \boxed{(2^{16} - 2) - i}$$

و إذا كان :  $n = 4k + 3 (k \in \mathbb{N})$  فإن :  $i^n = -i$ .

(2) حساب :  $(1+i)^2$  ،  $(1+i)^{2002}$ .

$$(1+i)^2 = 2i$$

$$(1+i)^{2002} = \left[(1+i)^2\right]^{1001} = (2i)^{1001}$$

$$= 2^{1001} \times i^{1001} = \boxed{2^{1001}i}$$

(لأن  $1001 = 4 \times 250 + 1$  من الشكل  $4k + 1$ )

**تمرين 05**

أكتب على الشكل الجبري الأعداد المركبة الآتية :

$$(1) \quad i(1+i)^2 - (1-2i)^2$$

$$(2) \quad i^3 \times \frac{1-i}{1+i} , \quad \frac{-1+3i}{1-2i} , \quad \frac{3-i}{(1+i)^2}$$

الحل

$$i(1+i)^2 - (1-2i)^2 = i(2i) - (-3-4i) \quad (1)$$

$$= \boxed{1+4i}$$

$$\frac{3-i}{(1+i)^2} = \frac{3-i}{2i} = \frac{(3-i)(-i)}{2} = \boxed{-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i} \quad (2)$$

$$\frac{-1+3i}{1-2i} = \frac{(-1+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{-7+i}{5} = \boxed{-\frac{7}{5} + \frac{1}{5}i}$$



### تمرين 07

$\alpha$  عدد مركب حيث :  $\alpha = x + iy$

نضع  $L = (1 - 2i)\alpha + 1 + 3i$  (1) عين  $\alpha$  لكي يكون  $L = 0$ .

(2) أ - عين مرافق  $L$  ( $\bar{L}$ ) . ب - استنتج مجموعة النقاط  $M$  ذات اللاحقة  $\alpha$  التي من أجلها يكون  $L = \bar{L}$ .

الحل

(1) تعيين  $\alpha$  لكي  $L = 0$ :

$$L = (1 - 2i)\alpha + 1 + 3i = (1 - 2i)(x + iy) + 1 + 3i \\ = (x + 2y + 1) + i(-2x + y + 3)$$

$$L = 0 \text{ يكافئ } \begin{cases} x + 2y + 1 = 0 \\ -2x + y + 3 = 0 \end{cases} \text{ ومنه } (x; y) = (1; -1)$$

$$\boxed{\alpha = 1 - i} \text{ إذن}$$

(2) - أ) تعيين مرافق  $L$  ( $\bar{L}$ ) .

$$\bar{L} = (x + 2y + 1) - i(-2x + y + 3)$$

ب) تعيين مجموعة النقاط  $M$  ذات اللاحقة  $\alpha$ :

$$(x + 2y + 1) - i(-2x + y + 3) = \bar{L} = (x + 2y + 1) + i(-2x + y + 3) \\ \text{يكافئ } L = \bar{L}$$

$$\text{ومنه: } 2i(-2x + y + 3) = 0 \text{ ومنه: } -2x + y + 3 = 0$$

إذن مجموعة النقط  $M$  المطلوبة هو المستقيم ( $D$ ) ذو المعادلة:  
 $-2x + y + 3 = 0$ .

### تمرين 08

نعتبر العدد المركب  $L = i \left( \frac{z - 2i}{z + i} \right)$  حيث  $z = x + iy$ .

(1) عين بطريقتين مختلفتين  $\bar{L}$ .

(2) أحسب  $L + \bar{L}$  ثم استنتج مجموعة النقاط  $M(z)$  من أجلها يكون  $L$  تخيليا صرفا.

الحل

(1) تعيين  $L$  بطريقتين مختلفتين:

$$\bar{L} = \overline{i \left( \frac{z - 2i}{z + i} \right)} = \bar{i} \times \frac{\overline{z - 2i}}{\overline{z + i}} = -i \times \frac{\bar{z} + 2i}{\bar{z} - i} \quad \text{ط 1:}$$

$$= \frac{-i(x - iy) + 2}{x - iy - i} = \frac{(2 - y) - ix}{x - (y + 1)i}$$

$$= \frac{[(2 - y) - ix][x + (y + 1)i]}{[x - (y + 1)i][x + (y + 1)i]}$$

$$= \frac{3x}{x^2 + (y + 1)^2} - \frac{x^2 + y^2 - y - 2}{x^2 + (y + 1)^2} i$$

ط 2:

$$L = i \left( \frac{z - 2i}{z + i} \right) = \frac{iz + 2}{z + i} = \frac{i(x + iy) + 2}{x + iy + i}$$

$$= \frac{(2 - y) + ix}{x + i(y + 1)} = \frac{[(2 - y) + ix][x - i(y + 1)]}{[x + i(y + 1)][x - i(y + 1)]}$$



### الحل

لنكتب  $L$  على الشكل الجبري:

$$\begin{aligned} L &= \frac{iz - (1+i)}{z - 2i} = \frac{i(x+iy) - (1+i)}{x+iy - 2i} \\ &= \frac{(-y-1) + i(x-1)}{x+i(y-2)} \\ &= \frac{[(-y-1) + i(x-1)][x-i(y-2)]}{[x+i(y-2)][x-i(y-2)]} \\ &= \frac{-3x-y+2}{x^2+(y-2)^2} + \frac{x^2+y^2-x-y-2}{x^2+(y-2)^2}i \end{aligned}$$

(1) تعيين مجموعة النقاط  $M(z)$  من أجلها يكون  $L$  حقيقيا.  
 $L$  حقيقي يعني تخيلي  $L$  معدوما ومنه :

$$\left( \frac{x^2+y^2-x-y-2}{x^2+(y-2)^2} = 0 \text{ و } (x,y) \neq (0;2) \right) \text{ ومنه :}$$

$$(x^2+y^2-x-y-2=0 \text{ و } (x,y) \neq (0;2)) \text{ ومنه :}$$

$$\left( \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 2 = 0 \right) \text{ و}$$

$$(x,y) \neq (0;2) \text{ ومنه :}$$

$$= \frac{3x}{x^2+(y+1)^2} + \frac{x^2+y^2-y-2}{x^2+(y+1)^2}i$$

$$\bar{L} = \frac{3x}{x^2+(y+1)^2} - \frac{x^2+y^2-y-2}{x^2+(y+1)^2}i \quad \text{ومنه :}$$

(2) حساب  $L + \bar{L}$  واستنتاج مجموعة النقاط  $M(z)$  لكي يكون  $L$  تخيليا صرفا .

$$L + \bar{L} = \frac{6x}{x^2+(y+1)^2}$$

نعلم أن  $L$  تخيليا صرفا معناه :  $L + \bar{L} = 0$  .

$$L + \bar{L} = 0 \text{ يكافئ } \frac{6x}{x^2+(y+1)^2} = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(x=0 \text{ مع } (x,y) \neq (0;-1))$$

إذن مجموعة النقاط  $M(z)$  المطلوبة هي المستقيم ذو المعادلة  $x=0$  (محور الترتيب) باستثناء النقطة  $(0;-1)$  .

### تمرين 09

نعتبر العدد المركب  $L = \frac{iz - (1+i)}{z - 2i}$  حيث  $z = x + iy$  .

(1) عين مجموعة النقاط  $M$  ذات اللاحقة  $z$  من أجلها يكون  $L$  حقيقيا .

(2) عين مجموعة النقاط  $M(z)$  لكي يكون  $L$  تخيليا صرفا .



(2) عين مجموعة النقط  $M(z)$  من أجلها تكون  
 $\arg(L) \equiv \pi [2\pi]$

الحل

(1- أ) تعيين مرافق  $L$ .

$$\begin{aligned}\bar{L} &= \overline{\left( \frac{z-4-2i}{z+2+i} \right)} = \frac{\bar{z}-4+2i}{\bar{z}+2-i} = \frac{x-iy-4+2i}{x-iy+2-i} \\ &= \frac{(x-4)-i(y-2)}{(x+2)-i(y+1)} \\ &= \frac{[(x-4)-i(y-2)][(x+2)+i(y+1)]}{[(x+2)-i(y+1)][(x+2)+i(y+1)]} \\ &= \frac{x^2+y^2-2x-y-10}{(x+2)^2+(y+1)^2} + \frac{3x-6y}{(x+2)^2+(y+1)^2} i\end{aligned}$$

(ب) استنتاج مجموعة النقط  $M(z)$  التي من أجلها يكون  $L$  حقيقيا.  
 لدينا :

$$\bar{L} = \frac{x^2+y^2-2x-y-10}{(x+2)^2+(y+1)^2} + \frac{3x-6y}{(x+2)^2+(y+1)^2} i$$

و نعلم أن :  $\bar{L} = L$  ومنه فإن :

$$\left( (x; y) \neq (0; 2) \text{ و } \left( x - \frac{1}{2} \right)^2 + \left( y - \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{5}{2} \right)$$

إذن مجموعة النقط  $M(z)$  المطلوبة هي الدائرة (C) التي

مركزها  $O\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$  و نصف قطرها  $\sqrt{\frac{5}{2}}$  باستثناء النقطة  $(0; 2)$

(2) تعيين مجموعة النقط  $M(z)$  لكي يكون  $L$  تخيليا صرفا.  
 $L$  تخيلي يعني حقيقي  $L$  معدوما ومنه :

$$\left( \frac{-3x-y+2}{x^2+(y-2)^2} \right) = 0 \text{ مع } ((x; y) \neq (0; 2)) \text{ ومنه :}$$

$$(-3x-y+2=0) \text{ مع } ((x; y) \neq (0; 2)).$$

مجموعة النقط  $M(z)$  المطلوبة هي المستقيم (D) ذو المعادلة :  
 $\boxed{-3x-y+2=0}$  ، باستثناء النقطة  $(0; 2)$ .


تمرين 10

ليكن  $L$  العدد المركب المعروف بـ :  $L = \frac{z-4-2i}{z+2+i}$ .

(1- أ) عين  $\bar{L}$  (مرافق  $L$ )

(ب) استنتاج مجموعة النقط  $M(z)$  ذات اللاحقة  $z$  بحيث  
 يكون  $L$  حقيقيا.





### تمرين 11

في مستوي الأعداد المركبة المزود بمعلم متعامد ومتجانس ، نعتبر النقاط  $A, M, C$  ذات اللواحق على الترتيب  $1+i, z, iz$  حيث :  $z = x + iy$

(1) عين مجموعة النقط  $M(z)$  لكي يكون المثلث  $ACM$  قائم الزاوية في  $A$ .

(2) عين مجموعة النقط  $M(z)$  بحيث تكون  $|z-1-i| = |iz-z|$

### الحل

(1) تعيين مجموعة النقط  $M(z)$  لكي يكون المثلث  $ACM$  قائم الزاوية في  $A$ .

لاحقة الشعاع  $\overline{AC}$  :

$$\begin{aligned} Z_{\overline{AC}} &= z_C - z_A = iz - 1 - i \\ &= i(x + iy) - 1 - i = (-1 - y) + i(x - 1) \end{aligned}$$

$$L = \frac{x^2 + y^2 - 2x - y - 10}{(x+2)^2 + (y+1)^2} - \frac{3x - 6y}{(x+2)^2 + (y+1)^2} i$$

$L$  حقيقي يعني تخيلي  $L$  معدوما ومنه :

(  $3x - 6y = 0$  و  $(x; y) \neq (-2; -1)$  ) ومنه :

(  $x - 2y = 0$  و  $(x; y) \neq (-2; -1)$  )

مجموعة النقط هي المستقيم  $(D): x - 2y = 0$  باستثناء النقطة  $(-2; -1)$ .

(2) تعيين مجموعة النقط  $M(z)$  من أجلها تكون

$$\arg(L) \equiv \pi [2\pi]$$

$\arg(L) \equiv \pi [2\pi]$  يكافئ  $L = 0$  و حقيقي  $L > 0$

يكافئ  $[3x - 6y = 0$  و  $x^2 + y^2 - 2x - y - 10 < 0$  و  $(x; y) \neq (-2; -1)$  ومنه :

$$[x - 2y = 0 \text{ و } (x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{45}{4} < 0]$$

و  $(x; y) \neq (-2; -1)$

إذن مجموعة النقط  $M(z)$  تنتمي إلى المستقيم  $(D)$  ذو المعادلة  $x - 2y = 0$  و تنتمي إلى القرص الذي مركزه

$\omega\left(1; \frac{1}{2}\right)$  ونصف قطره  $\frac{\sqrt{45}}{2}$  و هي ممثلة بالقطر  $[AB]$

باستثناء النقطتين  $A$  و  $B$ .



## تمرين 12

أكتب الأعداد المركبة الآتية على الشكل المثلثي :

$$z_1 = -2 + 2i ; z_2 = 5 - 5\sqrt{3}i ; z_3 = \sqrt{6} + \sqrt{2}i ;$$

$$z_4 = -2\sqrt{3} - 6i$$

### الحل

إذا كانت  $\theta_1$  هي عمدة  $z_1$  فإن :  $|z_1| = 2\sqrt{2}$

$$\sin \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ و } \cos \theta_1 = -\frac{2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ومنه } \theta_1 \text{ تنتمي}$$

$$\text{إلى الربع الثاني ومنه : } \theta_1 \equiv \pi - \frac{\pi}{4} \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

$$\text{إذن } z_1 = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$|z_2| = 10 \text{ ، إذا كانت } \theta_2 \text{ هي عمدة } z_2 \text{ فإن : } \cos \theta_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{و } \sin \theta_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ومنه } \theta_2 \text{ تنتمي إلى الربع الرابع ومنه :}$$

$$\text{إذن } \theta_2 \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi] \text{ ومنه } z_2 = 10 \left( \cos \left( -\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right)$$

$$|z_3| = 2\sqrt{2} \text{ ، إذا كانت } \theta_3 \text{ هي عمدة } z_3 \text{ فإن : } \cos \theta_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{و } \sin \theta_3 = \frac{1}{2} \text{ ومنه } \theta_3 \text{ تنتمي إلى الربع الأول ومنه :}$$

$$\text{ومنه : } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -y-1 \\ x-1 \end{pmatrix}$$

لاحقة الشعاع  $\overrightarrow{AM}$  :

$$Z_{\overrightarrow{AM}} = Z_M - Z_A = z - 1 - i \text{ ومنه : } \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \end{pmatrix} = (x-1) + i(y-1)$$

يكون المثلث  $ACM$  قائم الزاوية في  $A$  إذا كان  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$  ومنه :  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

$$(x-1)(-y-1) + (y-1)(x-1) = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(x-1)(-y-1 + y-1) = 0 \text{ ومنه } -2(x-1) = 0$$

$$\text{ومنه } x = 1$$

إذن مجموعة النقط المطلوبة هي المستقيم ذو المعادلة  $x = 1$ .

(2) تعيين مجموعة النقط  $M(z)$  :

$$|z - 1 - i| = |iz - z| \text{ يكافئ}$$

$$|(x-1) + i(y-1)| = |(-y-x) + i(x-y)|$$

$$\text{ومنه } (x-1)^2 + (y-1)^2 = (-x-y)^2 + (x-y)^2$$

$$\text{ومنه : } x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 - 4 = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 = 4 \text{ . إذن مجموعة النقط المطلوبة هي}$$

الدائرة التي مركزها  $\omega(-1; -1)$  ونصف قطرها 2 .



$$\equiv \frac{3\pi}{4} + \left(-\frac{\pi}{6}\right) \equiv \frac{7\pi}{12} [2\pi]$$

$$. L = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right) : \text{ومنه}$$

$$|L_1| = |1+i|^3 \times |-2i| = (\sqrt{2})^3 \times 2 = 4\sqrt{2} *$$

$$\arg L_1 \equiv \arg(1+i)^3 + \arg(-2i)$$

$$\equiv 3 \arg(1+i) + \arg(-2i) \equiv \frac{3\pi}{4} + \left(-\frac{\pi}{2}\right) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$. L_1 = 4\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) : \text{ومنه}$$

$$|L_2| = |\sqrt{3}+i|^3 \times \left| -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = 2^3 \times 1 = 8 *$$

$$\arg L_2 \equiv \arg(\sqrt{3}+i)^3 + \arg\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$\equiv 3 \arg(\sqrt{3}+i) + 2 \arg\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\equiv 3 \times \frac{\pi}{6} + 2 \times \frac{2\pi}{3} \equiv \frac{11\pi}{6} [2\pi]$$

$$. L_2 = 8 \left( \cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) : \text{ومنه}$$

$$. z_3 = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \text{ إذن } \theta_3 \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

$$\cos \theta_4 = -\frac{1}{2} : \text{فإن } z_4 \text{ هي عمدة } z_3 \text{ ، إذا كانت } \theta_4 \text{ ، } |z_4| = 4\sqrt{3}$$

$$\text{و } \sin \theta_4 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ومنه } \theta_4 \text{ تنتمي إلى الربع الثالث ومنه :}$$

$$\theta_4 \equiv \pi + \frac{\pi}{3} \equiv \frac{4\pi}{3} [2\pi]$$

$$. z_4 = 4\sqrt{3} \left( \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \text{ إذن}$$

### تمرين 13

(1) اكتب الأعداد المركبة الآتية على الشكل المثلثي :

$$. L_1 = (1+i)^3 (-2i) , L = (-1+i)(\sqrt{3}-i)$$

$$. L_2 = (\sqrt{3}+i)^3 \left( -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

$$. L_3 = i^{2003} (\sqrt{2} + \sqrt{6}i)^2$$

(2) اكتب الأعداد  $L_2, L_1, L$  على الشكل الأسّي .

### الحل

$$|L| = |-1+i| \times |\sqrt{3}-i| = 2\sqrt{2} * (1)$$

$$\arg L \equiv \arg(-1+i) + \arg(\sqrt{3}-i)$$



$$\arg(z_1) \equiv \arg(-1 + \sqrt{3}i)^4 \equiv 4\arg(-1 + \sqrt{3}i)$$

$$\equiv 4 \times \frac{2\pi}{3} \equiv 2\pi + \frac{2\pi}{3} \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

$$. z_1 = 16 \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) : \text{ومنه}$$

$$|z_2| = \frac{|1-i|^3}{|1+i\sqrt{3}|^2} = \frac{\sqrt{2}^3}{2^2} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\arg(z_2) \equiv \arg(1-i)^3 - \arg(1+i\sqrt{3})^2$$

$$\equiv 3 \times \arg(1-i) - 2 \times \arg(1+i\sqrt{3})$$

$$\equiv -\frac{3\pi}{4} - \frac{2\pi}{3} \equiv -\frac{17\pi}{12} [2\pi]$$

$$. z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \left( \cos \left( -\frac{17\pi}{12} \right) + i \sin \left( -\frac{17\pi}{12} \right) \right) : \text{ومنه}$$

$$|z_3| = \frac{|i|^{30}}{|\sqrt{3}+i|^{30}} = \frac{1}{2^{30}}$$

$$\arg(z_3) \equiv \arg(i^{30}) - \arg(\sqrt{3}+i)^{30}$$

$$\equiv 30 \times \arg(i) - 30 \times \arg(\sqrt{3}+i)$$

$$|L_3| = |i|^{2003} \times |\sqrt{2} + \sqrt{6}i|^2 = |i|^{2003} \times (\sqrt{8})^2 = 1 \times 8 = 8 *$$

$$\arg L_3 \equiv \arg(i^{2003}) + \arg(\sqrt{2} + \sqrt{6}i)^2$$

$$\equiv 2003 \times \arg(i) + 2 \arg(\sqrt{2} + \sqrt{6}i)$$

$$\equiv 2003 \times \frac{\pi}{2} + 2 \times \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

$$\equiv 1001\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} \equiv 1002\pi + \frac{\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

$$. L_3 = 8 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) : \text{ومنه}$$

$$. L_2 = 8e^{i\frac{11\pi}{6}}, \quad L_1 = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad L = 2\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}} \quad (2)$$

#### تمرين 14

اكتب الأعداد المركبة الآتية على الشكل المثلثي .

$$z_3 = \left( \frac{i}{\sqrt{3}+i} \right)^{30}, \quad z_2 = \frac{(1-i)^3}{(1+i\sqrt{3})^2}, \quad z_1 = \left( \frac{5+11\sqrt{3}i}{7-4\sqrt{3}i} \right)^4$$

#### الحل

$$z_1 = \left( \frac{5+11\sqrt{3}i}{7-4\sqrt{3}i} \right)^4 = \left( \frac{(5+11\sqrt{3}i)(7+4\sqrt{3}i)}{(7-4\sqrt{3}i)(7+4\sqrt{3}i)} \right)^4$$

$$|z_1| = |-1 + \sqrt{3}i|^4 = 2^4 = 16 : \text{ومنه } z_1 = (-1 + \sqrt{3}i)^4$$



$$z_3 = 1 + \cos \theta + i \sin \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{\theta}{2} \left( \cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

- إذا كان  $\theta \in ]0; \pi[$  فإن  $\frac{\theta}{2} \in ]0; \frac{\pi}{2}[$  إذن  $\cos \frac{\theta}{2} > 0$

$$\text{ومنه : } z_3 = 2 \cos \frac{\theta}{2} \left( \cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

- إذا كان  $\theta \in ]\pi; 2\pi[$  فإن  $\frac{\theta}{2} \in ]\frac{\pi}{2}; \pi[$  إذن  $\cos \frac{\theta}{2} < 0$

$$\text{ومنه : } z_3 = -2 \cos \frac{\theta}{2} \left[ \cos \left( \frac{\theta}{2} + \pi \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{2} + \pi \right) \right]$$

### تمرين 16

حل في  $\mathbb{C}$  المعادلات التالية :

$$(1) \quad 2iz + 2 - i = (1 + i)z + 1$$

$$(2) \quad (1 - 2iz)(1 + i)^2 - (1 + i)z = 0$$

$$(3) \quad \frac{iz}{1 + i} + \frac{z - 1}{1 - i} = 0$$

### الحل

$$(1) \quad 2iz + 2 - i = (1 + i)z + 1 \text{ ومنه :}$$

$$2iz - (1 + i)z = -1 + i$$

$$\equiv \frac{30\pi}{2} - \frac{30\pi}{6} \equiv 15\pi - 5\pi [2\pi]$$

$$\equiv 10\pi \equiv 0 [2\pi]$$

$$\text{ومنه : } z_3 = \frac{1}{20^{30}} (\cos 0 + i \sin 0)$$

### تمرين 15

اكتب الأعداد المركبة الآتية على الشكل المثلثي .

$$z_2 = -\sin \theta + i \cos \theta \quad , \quad z_1 = \sin \theta - i \cos \theta$$

$$z_3 = 1 + \cos \theta + i \sin \theta \quad \text{حيث : } \theta \in [0; 2\pi]$$

### الحل

$$z_1 = \sin \theta - i \cos \theta = \cos \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right) - i \sin \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$= \cos \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\text{ومنه : } z_1 = \cos \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$z_2 = -\sin \theta + i \cos \theta = \cos \left( \frac{\pi}{2} + \theta \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} + \theta \right)$$



### الحل

نضع  $z = x + iy$  ومنه  $\bar{z} = x - iy$ .

$$(1) \quad (1+i)z - (2+3i)\bar{z} - 1 + 9i = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(1+i)(x+iy) - (2+3i)(x-iy) - 1 + 9i = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(-x-4y-1) + i(-2x+3y+9) = 0 \text{ ومنه :}$$

$$\text{ومنه } \begin{cases} -x-4y-1=0 \\ -2x+3y+9=0 \end{cases} \text{ ومنه } (x=3; y=-1) \text{ ومنه :}$$

$$z = \boxed{3-i}$$

$$(2) \quad (z+2i)(\bar{z}+1-3i) = 14+2i \text{ ومنه :}$$

$$z\bar{z} + (1-3i)z + 2i\bar{z} + 2i(1-3i) = 14+2i \text{ ومنه :}$$

$$x^2 + y^2 + (1-3i)(x+iy) + 2i(x-iy) + 6+2i = 14+2i \text{ ومنه :}$$

$$x^2 + y^2 + x + 3y + (y-3x)i + 2y + 2xi - 8 = 0 \text{ ومنه}$$

$$(x^2 + y^2 + x + 5y - 8) + i(-x + y) = 0 \text{ يكافئ}$$

$$\begin{cases} 2x^2 + 6x - 8 = 0 \\ x = y \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} x^2 + y^2 + x + 5y - 8 = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$$

$$\text{ومنه حلول المعادلة هي : } \begin{cases} x_1 = -4 \\ x = y \end{cases} \text{ أو } \begin{cases} x_2 = 1 \end{cases} \text{ ومنه}$$

$$z_2 = \boxed{1+i} \text{ و } z_1 = \boxed{-4-4i}$$

$$z = \frac{-1+i}{-1+i} = \boxed{1} \text{ ومنه } (-1+i)z = -1+i$$

$$(2) \quad (1-2iz)(1+i)^2 - (1+i)z = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(1+i)^2 - (1+i)^2 \cdot 2iz - (1+i)z = 0 \text{ ومنه :}$$

$$2i + (4-1-i)z = 0 \text{ ومنه : } 2i + 4z - (1+i)z = 0$$

$$\text{ومنه : } (3-i)z = -2i \text{ ومنه } z = \frac{-2i}{3-i} = \boxed{\frac{1}{5} - \frac{3}{5}i}$$

$$(3) \quad \frac{(1-i)iz + (1+i)(z-1)}{(1+i)(1-i)} = 0 \text{ ومنه } \frac{iz}{1+i} + \frac{z-1}{1-i} = 0$$

$$\text{ومنه : } \frac{iz + z + z - 1 + iz - i}{2} = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(2+2i)z = 1+i \text{ ومنه : } \frac{(2+2i)z - (1+i)}{2} = 0$$

$$\text{ومنه : } z = \frac{1+i}{2(1+i)} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

### تمرين 17

حل في  $\mathbb{C}$  المعادلات التالية :

$$(1) \quad (1+i)z - (2+3i)\bar{z} - 1 + 9i = 0$$

$$(2) \quad (z+2i)(\bar{z}+1-3i) = 14+2i$$

$$(3) \quad z\bar{z} + (z-\bar{z}) - 2i - 5 = 0$$



- إذا كان  $\beta = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $z_2$  فإن  $\beta^2 = z_1$ .

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 8 & \dots(1) \\ x^2 + y^2 = |z_1| = 10 & \dots(2) \text{ يكافئ } \beta^2 = z_1 \\ xy = -3 & \dots(3) \end{cases}$$

بجمع (1) و (2) نجد  $x^2 = 9$  ومنه :  $x_1 = -3$  أو  $x_2 = +3$   
بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = 1$  و  $y_2 = -1$  ومنه :

$$\beta_1 = \boxed{-3+i} \text{ و } \beta_2 = \boxed{3-i}$$

$$z_3 = 4 \left( \frac{11+2i}{1+2i} \right) = 4 \frac{(11+2i)(1-2i)}{5} = 4(3-4i)$$

- إذا كان  $\delta = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $z_3$  فإن  $\delta^2 = z_3$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 12 & \dots(1) \\ x^2 + y^2 = |z_3| = 20 & \dots(2) \text{ يكافئ } \delta^2 = z_3 \\ xy = -8 & \dots(3) \end{cases}$$

بجمع (1) و (2) نجد  $x^2 = 16$  ومنه :  $x_1 = -4$  أو  $x_2 = 4$   
بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = 2$  و  $y_2 = -2$  ومنه :

$$\delta_1 = \boxed{-4+2i} \text{ و } \delta_2 = \boxed{4-2i}$$

### تمرين 19

حل في  $\mathbb{C}$  المعادلات التالية ذات المجهول  $z$  :

$$(3) \quad z\bar{z} + (z - \bar{z}) - 2i - 5 = 0 \text{ يكافئ}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 5 = 0 \\ 2(y-1) = 0 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} x^2 + y^2 - 5 = 0 \\ y = 1 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases} \text{ و } \begin{cases} y = 1 \end{cases}$$

ومنه حلول المعادلة هي :  $z_1 = \boxed{2+i}$  و  $z_2 = \boxed{-2+i}$

### تمرين 18

احسب الجذور التربيعية للأعداد المركبة التالية :

$$z_3 = 4 \left( \frac{11+2i}{1+2i} \right), \quad z_2 = 8-6i, \quad z_1 = -3+4i$$

### الحل

- إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $z_1$  فإن  $\alpha^2 = z_1$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -3 & \dots(1) \\ x^2 + y^2 = |z_1| = 5 & \dots(2) \text{ يكافئ } \alpha^2 = z_1 \\ xy = 2 & \dots(3) \end{cases}$$

بجمع (1) و (2) نجد  $x^2 = 1$  ومنه :  $x_1 = 1$  أو  $x_2 = -1$   
بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = 2$  و  $y_2 = -2$  ومنه :

$$\alpha_1 = \boxed{1+2i} \text{ و } \alpha_2 = \boxed{-1-2i}$$



بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = -4$  و  $y_2 = 4$  ومنه :

$$\alpha_2 = -1 + 4i \text{ و } \alpha_1 = 1 - 4i$$

$$z_1 = \frac{(3-2i) + (1-4i)}{2} = \boxed{2-3i} \text{ : ومنه حلول المعادلة هي :}$$

$$z_2 = \frac{(3-2i) - (1-4i)}{2} = \boxed{1+i}$$

$$z^2 - (1+i\sqrt{3})z + i\sqrt{3} = 0 \quad (3)$$

$$\Delta = (1+i\sqrt{3})^2 - 4i\sqrt{3} = -2 - 2i\sqrt{3}$$

- إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $\Delta$  فإن  $\alpha^2 = \Delta$ .

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -2 & \dots (1) \\ x^2 + y^2 = 4 & \dots (2) \text{ يكافئ } \alpha^2 = \Delta \\ xy = -\sqrt{3} & \dots (3) \end{cases}$$

بجمع (1) و (2) نجد  $x^2 = 1$  ومنه :  $(x_1 = 1 \text{ أو } x_2 = -1)$

بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = -\sqrt{3}$  و  $y_2 = +\sqrt{3}$  ومنه :

$$\alpha_2 = -1 + \sqrt{3}i \text{ و } \alpha_1 = 1 - \sqrt{3}i$$

$$z_1 = \frac{(1+\sqrt{3}i) + (1-\sqrt{3}i)}{2} = \boxed{1} \text{ : ومنه حلول المعادلة هي :}$$

$$(1) \quad z^2 + (1-3i)z - 2(1+i) = 0$$

$$(2) \quad z^2 - (3-2i)z + 5-i = 0$$

$$(3) \quad z^2 - (1+i\sqrt{3})z + i\sqrt{3} = 0$$

$$(4) \quad (1+i)z^2 - 2(1+4i)z - (3-11i) = 0$$

الحل

$$(1) \quad z^2 + (1-3i)z - 2(1+i) = 0$$

$$\Delta = (1-3i)^2 + 8(1+i) = 2i = (1+i)^2$$

$$z_1 = \frac{-(1-3i) - (1+i)}{2} = \boxed{-1+i} \text{ : ومنه}$$

$$z_2 = \frac{-(1-3i) + (1+i)}{2} = \boxed{2i}$$

$$(2) \quad z^2 + (3-2i)z + 5-i = 0$$

$$\Delta = (3-2i)^2 - 4(5-i) = -15 - 8i$$

- إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $\Delta$  فإن  $\alpha^2 = \Delta$ .

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -15 & \dots (1) \\ x^2 + y^2 = 17 & \dots (2) \text{ يكافئ } \alpha^2 = \Delta \\ xy = -4 & \dots (3) \end{cases}$$

بجمع (1) و (2) نجد  $x^2 = 1$  ومنه :  $(x_1 = 1 \text{ أو } x_2 = -1)$



$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 48 & \dots(1) \\ \alpha^2 + \beta^2 = 50 & \dots(2) \text{ يكافئ } (\alpha + \beta i)^2 = 48 - 14i \\ \alpha\beta = -7 & \dots(3) \end{cases}$$

بجمع (1) و (2) نجد  $\alpha^2 = 49$  ومنه :  $\alpha_1 = 7$  أو  $\alpha_2 = -7$   
بالتعويض في (3) نجد :  $\beta_1 = -1$  و  $\beta_2 = 1$  ومنه :

$$(\alpha; \beta) \in \{(7; -1), (-7; 1)\}$$

(2) حلول المعادلة :  $z^2 + (1 - 3i)z + (-14 + 2i) = 0$

$$\Delta = (1 - 3i)^2 - 4(-14 + 2i) = -8 - 6i + 56 - 8i$$

$$= 48 - 14i = (7 - i)^2 \quad (\text{من السؤال الأول})$$

$$z_1 = \frac{-(1 - 3i) - (7 - i)}{2} = \boxed{-4 + 2i} \quad \text{ومنه :}$$

$$z_2 = \frac{-(1 - 3i) + (7 - i)}{2} = \boxed{3 + i}$$

(3) البرهان على أن المثلث  $CAB$  قائم الزاوية في  $C$ .

$$Z_{\overline{AC}} = Z_C - Z_A = (-3 - i) - (3 + i) = -6 - 2i$$

$$\text{ومنه : } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\overline{BC}} = Z_C - Z_B = (-3 - i) - (-4 + 2i) = 1 - 3i$$

$$z_2 = \frac{(1 + \sqrt{3}i) - (1 - \sqrt{3}i)}{2} = \boxed{\sqrt{3}i}$$

$$(1 + i)z^2 - 2(1 + 4i)z - (3 - 11i) = 0 \quad (4)$$

$$\Delta' = (1 + 4i)^2 + (1 + i)(3 - 11i) = -1 = i^2$$

ومنه حلول المعادلة هي :

$$z_1 = \frac{(1 + 4i) + i}{(1 + i)} = \frac{1 + 5i}{1 + i} = \frac{(1 + 5i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \boxed{3 + 2i}$$

$$z_2 = \frac{(1 + 4i) - i}{(1 + i)} = \frac{1 + 3i}{1 + i} = \frac{(1 + 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \boxed{2 + i}$$

### تمرين 20

(1) عين العددين الحقيقيين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث :  $(\alpha + \beta i)^2 = 48 - 14i$

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 + (1 - 3i)z + (-14 + 2i) = 0$

نرمز بـ  $z_1$  و  $z_2$  إلى حلول المعادلة حيث :  $\text{Re}(z_2) < 0$ .

(3) في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس نعتبر النقط

$C, A, B$  ذات اللواحق على الترتيب :  $-3 - i, z_1, z_2$ .

- برهن أن المثلث  $CAB$  قائم الزاوية في  $C$ .

### الحل

(1) تعيين العددين  $\alpha$  و  $\beta$ .



$$= \alpha^2 + 2\alpha + 2\alpha i + 2i = \alpha^2 + 2\alpha + 2(\alpha + 1)i$$

$$= [(\alpha + 1) + i]^2$$

ومنه :

$$z_1 = -(\alpha + 2 + 2i) + (\alpha + 1) + i = \boxed{-1 - i}$$

$$z_2 = -(\alpha + 2 + 2i) - (\alpha + 1) - i = \boxed{(-2\alpha - 3) - 3i}$$

(3) نعين  $\alpha$  لكي يكون جذري المعادلة  $z_1$  و  $z_2$  متعاكسان .

$z_1$  و  $z_2$  متعاكسان يعني  $z_1 + z_2 = 0$  ومنه :

$$-2\alpha - 4 - 4i = 0 \quad \text{ومنه : } \alpha + 2 + 2i = 0 \quad \text{ومنه}$$

$$\alpha = \boxed{-2 - 2i}$$

تمرين 22

$$(1) \text{ حل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة : } z^2 - (1 + \sin \alpha)z + \frac{1}{2}i \sin \alpha = 0$$

هــبـث :  $\alpha \in ]0; \pi[$  (2) أكتب الجذرين  $z'$  و  $z''$  على الشكل المثلثي .

(3) عين  $\alpha$  لكي يكون  $z' = z''$

الحل

$$(1) \text{ حل المعادلة : } z^2 - (1 + \sin \alpha)z + \frac{1}{2}i \sin \alpha = 0$$

$$\Delta = (1 + i \sin \alpha)^2 - 4 \times \frac{1}{2}i \sin \alpha$$

$$= (1 - \sin^2 \alpha) + 2i \sin \alpha - 2i \sin \alpha = \cos^2 \alpha$$

$$\text{ومنه : } \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{لدينا : } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = (-6)(+1) + (-2)(-3) = 0$$

إذن  $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BC}$  ومنه المثلث  $CAB$  قائم الزاوية في  $C$  .

تمرين 21

$\alpha$  عدد مركب غير معدوم .

(1) تحقق أن  $\alpha^2 + 2(\alpha + 1)i + 2\alpha$  هو مربع لثنائي الحد

بطلب تعيينه .

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :

$$z^2 + 2(\alpha + 2 + 2i)z + 2\alpha(1 + i) + 6i = 0$$

(3) عين  $\alpha$  لكي يكون جذري المعادلة متعاكسان .

الحل

(1) التحقق بأن  $\alpha^2 + 2(\alpha + 1)i + 2\alpha$  هو مربع لثنائي الحد.

$$[(\alpha + 1) + i]^2 = (\alpha + 1)^2 + 2(\alpha + 1)i - 1$$

$$= \alpha^2 + 2\alpha + 2(\alpha + 1)i$$

إذن  $\alpha^2 + 2(\alpha + 1)i + 2\alpha$  هو مربع لثنائي الحد  $(\alpha + 1) + i$

(2) حل المعادلة :  $z^2 + 2(\alpha + 2 + 2i)z + 2\alpha(1 + i) + 6i = 0$

$$\Delta' = (\alpha + 2 + 2i)^2 - 2\alpha(1 + i) - 6i$$

$$= (\alpha + 2)^2 + 2(\alpha + 2) \times 2i - 4 - 2\alpha - 2\alpha i - 6i$$

$$= (\alpha^2 + 4\alpha + 4) + 4\alpha i + 8i - 4 - 2\alpha - 2\alpha i - 6i$$



$$z' = \frac{(1 + i \sin \alpha) - \cos \alpha}{2} = \frac{(1 - \cos \alpha) + i \sin \alpha}{2}$$

ومنه :

$$= \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + 2i \sin \frac{\alpha}{2} \times \cos \frac{\alpha}{2}}{2} =$$

$$z' = \sin \frac{\alpha}{2} \left( \sin \frac{\alpha}{2} + i \cos \frac{\alpha}{2} \right) \quad \text{إذن :}$$

$$z'' = \frac{(1 + i \sin \alpha) + \cos \alpha}{2} = \frac{(1 + \cos \alpha) + i \sin \alpha}{2}$$

$$= \frac{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2i \sin \frac{\alpha}{2} \times \cos \frac{\alpha}{2}}{2}$$

$$z'' = \cos \frac{\alpha}{2} \left( \cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right) \quad \text{إذن :}$$

(2) كتابة  $z'$  و  $z''$  على الشكل المثلثي .

$$z' = \sin \frac{\alpha}{2} \left( \sin \frac{\alpha}{2} + i \cos \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$= \sin \frac{\alpha}{2} \left[ \cos \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \right]$$

$$\text{وبما أن } \sin \frac{\pi}{2} > 0 \text{ فإن } \frac{\alpha}{2} \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[ \quad \text{ومنه}$$

$$z' = \sin \frac{\alpha}{2} \left[ \cos \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) \right]$$

$$\text{وبما أن } \frac{\alpha}{2} \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[ \text{ فإن } \cos \frac{\alpha}{2} > 0 \text{ ومنه :}$$

$$z'' = \cos \frac{\alpha}{2} \left( \cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right)$$

(3) نعين  $\alpha$  بحيث  $z' = z''$

$$z' = z'' \text{ يكافئ } |z'| = |z''| \text{ و } \arg(z'') = \arg(z') + 2K\pi$$

$$\left( \frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} + 2K\pi \text{ و } \sin \frac{\alpha}{2} = \cos \frac{\alpha}{2} \right) \quad \text{بمالي}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + 2K\pi \quad \text{ومنه :}$$

### تمرين 23

$\alpha$  عدد مركب معلوم طويلته  $r$  و عمدته  $\theta$  .

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  :

$$z^2 - \alpha(\alpha + i)z + i\alpha^3 = 0$$

(2) اكتب  $z'$  و  $z''$  جذري المعادلة على الشكل المثلثي .

(3) نفرض  $\alpha = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$  . أ - احسب  $z'^{2000}$  و  $z''^{2000}$  .

ب - عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $(z')^n$  و  $(z'')^n$  حقيقيان .

### الحل

$$(1) \text{ حل المعادلة : } z^2 - \alpha(\alpha + i)z + i\alpha^3 = 0$$



لدينا :  $z' = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$  ،  $z'' = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$  ومنه :

$$(z')^n = \cos \left( n \times \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( n \times \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(z'')^n = \cos \left( n \times \frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left( n \times \frac{3\pi}{4} \right)$$

$z'^n \in \mathbb{R}$  و  $z''^n \in \mathbb{R}$  يكافئ

$\sin \left( n \frac{\pi}{2} \right) = 0$  و  $\sin \left( n \frac{3\pi}{4} \right) = 0$  ومنه :

$(K; K') \in \mathbb{N}^2$  حيث  $\frac{n\pi}{2} = K\pi$  و  $n \frac{3\pi}{4} = K'\pi$

ومنه :  $(n = 2K \text{ و } 3n = 4K')$  ومنه :

$(n = 2K \text{ و } n = 4K'')$  ومنه  $n$  مضاعفات 4.

### تمرين 24

لتكن في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^3 - iz^2 + (1-i)z - 2 + 2i = 0$ .

(1) بين أن هذه المعادلة تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$  يطلب تعيينه .

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة . ليكن  $z_1$  ،  $z_2$  الجذرين الآخرين للمعادلة

حيث  $|z_1| < |z_2|$  .

(3) في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ، نعتبر النقط

$A$  ،  $B$  ،  $C$  صور الأعداد المركبة  $z_0$  ،  $z_1$  ،  $z_2$  على الترتيب .

- ما هي طبيعة المثلث  $ABC$  ؟

$$\Delta = \alpha^2 (\alpha + i)^2 - 4i\alpha^3 = \alpha^2 [(\alpha + i)^2 - 4i\alpha]$$

$$= \alpha^2 (\alpha^2 - 2i\alpha + i^2) = \alpha^2 (\alpha - i)^2$$

$$z' = \frac{\alpha(\alpha + i) + \alpha(\alpha - i)}{2} = \alpha^2$$

$$z'' = \frac{\alpha(\alpha + i) - \alpha(\alpha - i)}{2} = \alpha i$$

(2) كتابة  $z'$  و  $z''$  على الشكل المثلثي .

لدينا  $\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  ومنه :

$z' = \alpha^2 = r^2 (\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$

$$z'' = \alpha i = r \left[ \cos \left( \frac{\pi}{2} + \theta \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} + \theta \right) \right]$$

(3) أ - حساب  $z'^{2000}$  و  $z''^{2000}$  .

$$z'^{2000} = \cos \left( \frac{\pi}{2} \times 2000 \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} \times 2000 \right)$$

$$= \cos(1000\pi) + i \sin(1000\pi) = 1$$

(لأن  $\sin K\pi = 0$  و  $\cos K\pi = 1$  إذا كان  $K$  زوجيا )

$$z''^{2000} = \cos \left( \frac{3\pi}{4} \times 2000 \right) + i \sin \left( \frac{3\pi}{4} \times 2000 \right)$$

$$= \cos(1500\pi) + i \sin(1500\pi) = 1$$

ب - تعيين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $(z')^n$  و  $(z'')^n$  حقيقيان.



### الحل

(1) تعيين الجذر الحقيقي  $z_0$  للمعادلة :

$$z_0^3 - iz_0^2 + (1-i)z_0 - 2 + 2i = 0 \text{ يعني جذر للمعادلة}$$

$$\text{ومنه : } (z_0^3 + z_0 - 2) + i(-z_0^2 - z_0 + 2) = 0 \text{ ومنه :}$$

$$\begin{cases} z_0^3 + z_0 - 2 = 0 & \dots (1) \\ -z_0^2 - z_0 + 2 = 0 & \dots (2) \end{cases}$$

المعادلة (2) تقبل حلين  $z_0' = -2$  ،  $z_0'' = 1$  حيث الجذر  $z_0'' = 1$  يحقق المعادلة (1) فهو مقبول و الجذر الثاني  $z_0' = -2$  لا يحقق المعادلة (1) فهو مرفوض و منه  $z_0 = 1$ .

$$(2) \text{ حل المعادلة : } z^3 - iz^2 + (1-i)z - 2 + 2i = 0 \dots *$$

$$z^3 - iz^2 + (1-i)z - 2 + 2i = (z-1)(z^2 + az + c)$$

$$= z^3 + (a-1)z^2 + (c-a)z - c$$

$$\text{بالمطابقة نجد : } \begin{cases} a-1 = -i \\ c-a = 1-i \\ -c = -2+2i \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a = 1-i \\ c = 2-2i \end{cases}$$

$$* \text{ يكافئ } (z-1)[z^2 + (1-i)z + 2-2i] = 0 \text{ ومنه :}$$

$$(z=1 \text{ أو } z^2 + (1-i)z + 2-2i = 0 \dots **)$$

\*\* معادلة من الدرجة الثانية مميزها  $\Delta$  حيث :

$$\Delta = (1-i)^2 - 4(2-2i) = -8 + 6i$$

(إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $\Delta$  فإن  $\alpha^2 = \Delta$ ).

$$\alpha^2 = \Delta \text{ يكافئ } \begin{cases} x^2 - y^2 = -8 & \dots (1) \\ x^2 + y^2 = 10 & \dots (2) \\ xy = 3 & \dots (3) \end{cases} \text{ بجمع (1) و (2)}$$

$$\text{نجد } x^2 = 1 \text{ ومنه : } (x_1 = 1 \text{ أو } x_2 = -1)$$

بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = 3$  و  $y_2 = -3$  ومنه :

$$\alpha_1 = 1 + 3i \text{ و } \alpha_2 = -1 - 3i \text{ ومنه :}$$

$$z_1 = \frac{-(1-i) - (1+3i)}{2} = \boxed{-1-i}$$

$$z_2 = \frac{-(1-i) + (1+3i)}{2} = \boxed{2i}$$

ومنه حلول المعادلة هي :  $z_0 = 1$  ،  $z_1 = -1-i$  ،  $z_2 = 2i$

(3) طبيعة المثلث  $ABC$  :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ ومنه : } z_{\overrightarrow{AB}} = z_1 - z_0 = -2 - i$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ +2 \end{pmatrix} \text{ ومنه : } z_{\overrightarrow{AC}} = z_2 - z_0 = -1 + 2i$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2)(-1) + (-1)(+2) = 0$$

إذن  $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$  ومنه المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $A$  و متساوي الساقين.



## تمرين 25

ليكن كثير الحدود  $P(z)$  المعروف كمل يلي :

$$P(z) = 2z^3 + 2iz^2 + (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3} + 3i$$

(1) برهن أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا تخيليا صرفا  $z_0$  يطلب تعيينه.

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $P(z) = 0$  ، نرسم  $z_1$  للجذر الذي جزؤه الحقيقي سالب و  $z_2$  للجذر الثالث .

(3) أ - أكتب  $z_0$  ،  $z_1$  ،  $z_2$  على الشكل المثلثي .

ب - احسب العدد المركب  $L = (z_0)^{2000} + (z_1)^{1992} + (z_2)^{1998}$

### الحل

(1) تعيين الجذر التخيلي  $z_0$  :

إذا كان  $z_0 = \alpha i$  جذرا تخيليا صرفا للمعادلة  $P(z) = 0$  فإن :

$$P(\alpha i) = 0 \text{ ومنه :}$$

$$2(\alpha i)^3 + 2i(\alpha i)^2 + (1 + i\sqrt{3})(\alpha i) + \sqrt{3} + 3i = 0$$

$$\text{ومنه } -2\alpha^3 i - 2\alpha^2 i + \alpha i - \alpha\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3i = 0 \text{ ومنه :}$$

$$\sqrt{3}(1 - \alpha) + i(-2\alpha^3 - 2\alpha^2 + \alpha + 3) = 0 \text{ يكافئ}$$

$$\begin{cases} \sqrt{3}(1 - \alpha) = 0 \\ -2\alpha^3 - 2\alpha^2 + \alpha + 3 = 0 \end{cases} \text{ ومنه } \alpha = 1 \text{ ومنه } z_0 = i$$

(2) حل المعادلة  $P(z) = 0$  :

$$P(z) = (z - i)(2z^2 + az + c)$$

$$= 2z^3 + (a - 2i)z^2 + (c - ai)z - ci$$

$$\begin{cases} a = 4i \\ c = -3 + \sqrt{3}i \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} a - 2i = 2i \\ c - ai = 1 + i\sqrt{3} \\ -ci = \sqrt{3} + 3i \end{cases} \text{ بالمطابقة نجد :}$$

$$P(z) = 0 \text{ ومنه } (z - i)(2z^2 + 4iz - 3 + \sqrt{3}i) = 0 \text{ ومنه}$$

$$(2z^2 + 4iz - 3 + \sqrt{3}i = 0 \text{ أو } z = i)$$

$$\Delta' = (2i)^2 - 2(-3 + \sqrt{3}i) = 2 - 2\sqrt{3}i$$

إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $\Delta'$  فإن  $\alpha^2 = \Delta'$

$$\alpha^2 = \Delta' \text{ يكافئ } \begin{cases} x^2 - y^2 = 2 \dots (1) \\ x^2 + y^2 = 4 \dots (2) \\ xy = -\sqrt{3} \dots (3) \end{cases} \text{ بجمع (1) و (2) نجد}$$

$$x^2 = 3 \text{ ومنه : } (x_1 = \sqrt{3} \text{ أو } x_2 = -\sqrt{3})$$

بالتعويض في (3) نجد :  $y_1 = -1$  و  $y_2 = 1$  ومنه :

$$\alpha_1 = \sqrt{3} - i \text{ و } \alpha_2 = -\sqrt{3} + i \text{ ومنه :}$$

$$z_1 = \frac{-2i - (\sqrt{3} - i)}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$



$$L = \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 2000\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2000\right) \\ + \cos\left(\frac{7\pi}{6} \times 1992\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{6} \times 1992\right) \\ + 3^{999} \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{3} \times 1998\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3} \times 1998\right) \right]$$

$$L = \cos(1000\pi) + i \sin(1000\pi) \\ + \cos(2324\pi) + i \sin(2324\pi)$$

$$+ 3^{999} [\cos(-666\pi) + i \sin(-666\pi)]$$

$$L = (1+0) + (1+0) + 3^{999} (1+0) = \boxed{2 + 3^{999}}$$

### تمرين 26

عين الجذر من الرتبة الرابعة للعدد المركب :  $z = 8\sqrt{2}(1+i)$

### الحل

$$z = 8\sqrt{2}(1+i) = 16 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ . إذا كان}$$

$\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  هو جذر من الرتبة الرابعة للعدد  $z$  فإن :

$$\alpha^4 = z \quad \text{يكافئ}$$

$$r^4 (\cos 4\theta + i \sin 4\theta) = 16 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad \text{يكافئ}$$

$$z_2 = \frac{-2i + (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$$

إذن حلول المعادلة  $P(z) = 0$  هي :

$$z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i, \quad z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i, \quad z_0 = i$$

(3) كتابة  $z_2, z_1, z_0$  على الشكل المثلثي .

$$z_0 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

لدينا  $|z_1| = 1$  وإذا كانت  $\theta_1$  هي عمدة  $z_1$  فإن  $\cos \theta_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

و  $\sin \theta_1 = -\frac{1}{2}$  ومنه :  $\theta_1 \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi]$  و بالتالي :

$$z_1 = \cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}$$

لدينا  $|z_2| = \sqrt{3}$  وإذا كانت  $\theta_2$  هي عمدة  $z_2$  فإن  $\cos \theta_2 = \frac{1}{2}$

و  $\sin \theta_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  ومنه :  $\theta_2 \equiv \frac{-\pi}{3} [2\pi]$  و التالي :

$$z_2 = \sqrt{3} \left[ \cos \left( \frac{-\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{-\pi}{3} \right) \right]$$

$$L = (z_0)^{2000} + (z_1)^{1992} + (z_2)^{1998} \quad \text{ب- حساب العدد}$$



بضرب المعادلة (1) في  $-(1-i)$  و المعادلة (2) في  $(1+i)$

$$\begin{cases} -2z' + (3+i)z'' = -3+i & \dots (3) \\ 2z' + (1+3i)z'' = -1+3i & \dots (4) \end{cases}$$

نجد:

بجمع المعادلتين (3) و (4) نجد:  $4(1+i)z'' = -4(1-i)$

$$z'' = \frac{-1+i}{1+i} = \frac{(-1+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \boxed{i}$$

بتعويض  $z''$  بـ  $i$  في المعادلة (1) نجد:  $(1+i)z' = 2i$  ومنه:

$$z' = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i(1-i)}{2} = \boxed{1+i}$$

$$L = \left( \frac{z'}{\sqrt{2}} \right)^{2000} + (z'')^{2002} \quad \text{(2) حساب العدد}$$

$$z' = 1+i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$z'' = i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

$$L = \cos \left( \frac{\pi}{4} \times 2000 \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{4} \times 2000 \right) +$$

$$\cos \left( \frac{\pi}{2} \times 2002 \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} \times 2002 \right)$$

$$(r^4 = 16 \text{ و } 4\theta = \frac{\pi}{4} + 2K\pi \text{ ومنه } r = 2 \text{ و})$$

$$\theta = \frac{\pi}{16} + K \frac{\pi}{2} \text{ مع } K \in \{0, 1, 2, 3\} \text{ ومنه الجذور من الرتبة}$$

$$\alpha_0 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right) \text{ هي: الرابعة للعدد } z$$

$$\alpha_1 = 2 \left( \cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16} \right)$$

$$\alpha_2 = 2 \left( \cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16} \right)$$

$$\alpha_3 = 2 \left( \cos \frac{25\pi}{16} + i \sin \frac{25\pi}{16} \right)$$

تمرين 27

$$\begin{cases} (1+i)z' - (1+2i)z'' = 2+i \\ (1-i)z' + (2+i)z'' = 1+2i \end{cases} \quad \text{(1) حل في } \mathbb{C}^2 \text{ الجملة:}$$

$$L = \left( \frac{z'}{\sqrt{2}} \right)^{2000} + (z'')^{2002} \quad \text{(2) احسب}$$

الحل

$$\begin{cases} (1+i)z' - (1+2i)z'' = 2+i & \dots (1) \\ (1-i)z' + (2+i)z'' = 1+2i & \dots (2) \end{cases} \quad \text{(1) حل الجملة:}$$



$$L = \cos 500\pi + i \sin 500\pi + \cos 1001\pi + i \sin 1001\pi \\ = (1+0) + (-1+0) = 0$$

### تمرين 28

(1) أ - اكتب  $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$  على الشكل المثلثي .

ب - عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z_0^n$  حقيقيا .

(2) ليكن  $z_1$  العدد المركب المعروف كما يلي :

$$z_0 \times z_1 = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$$

- اكتب  $z_1$  على الشكل المثلثي ثم على الشكل الجبري .

(3) استنتج قيمة  $\cos \frac{7\pi}{12}$  و  $\sin \frac{7\pi}{12}$ .

### الحل

(1) كتابة  $z_0$  على الشكل المثلثي و تعيين  $n$  ليكون  $z_0^n$  حقيقيا .

$$|z_0| = 2 \text{ إذا كان } \theta \text{ هي عمدة } z_0 \text{ فإن } \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ و } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ومنه } \theta \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \text{ ومنه : } z_0 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\text{إذن } z_0^n = 2^n \left( \cos n \frac{\pi}{3} + i \sin n \frac{\pi}{3} \right)$$

$$z_0^n \in \mathbb{R} \text{ معناه تخيلي } z_0^n \text{ معدوم ومنه : } \sin n \frac{\pi}{3} = 0$$

$$\text{ومنه : } n \frac{\pi}{3} = K\pi \text{ ( } K \in \mathbb{N} \text{ ) ومنه : } n = 3K$$

(2) كتابة  $z_1$  على الشكل المثلثي ثم على الشكل الجبري .

$$\text{لدينا : } z_0 \times z_1 = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right) \text{ ومنه :}$$

$$z_1 = \frac{2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)}{z_0} \text{ ومنه :}$$

$$z_1 = \frac{2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)}{2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)} \text{ ومنه :}$$

$$z_1 = \cos \left( \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{3} \right) = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$$

$$\text{ومنه : } z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i$$

$$(3) \text{ استنتج قيمة } \cos \frac{7\pi}{12} \text{ و } \sin \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{لدينا : } z_0 \times z_1 = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right) \text{ ومنه :}$$

$$(1 + i\sqrt{3}) \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$$



$$\beta^3 = L \text{ يكافئ}$$

$$r^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta) = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$r^3 = 2\sqrt{2} \text{ و } \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{2K\pi}{3} \text{ حيث } K \in \{0, 1, 2\} \text{ ومنه :}$$

$$r = \sqrt[3]{2\sqrt{2}} = \sqrt[3]{\sqrt{8}} = \sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}$$

$$\text{و } \theta = \frac{3\pi + 8K\pi}{12} \text{ حيث } K \in \{0, 1, 2\} \text{ ومنه :}$$

$$\beta_0 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\beta_1 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

$$\beta_2 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{19\pi}{12} + i \sin \frac{19\pi}{12} \right)$$

$$(2) \text{ أ - حساب } (1+i)^3$$

$$(1+i)^3 = (1+i)(1+i)^2 = (1+i) \times 2i = -2 + 2i$$

ب - تعيين الجذور التكعيبية للعدد 1 على الشكل الجبري.

$$\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta) \text{ جذرا } 1 = \cos 0 + i \sin 0$$

تكعيبيا للعدد 1 .

$$\alpha^3 = 1 \text{ ومنه } r^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta) = \cos 0 + i \sin 0$$

$$\text{ومنه : } \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}i = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$$

$$\text{ومنه : } \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}i = \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12}$$

$$\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \text{ و } \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

### تمرين 29

- (1) احسب الجذور التكعيبية للعدد  $L = -2 + 2i$
- (2) أ - احسب  $(1+i)^3$  . ب - عين الجذور التكعيبية للعدد 1 على الشكل الجبري.
- (3) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^3 + 2(1-i) = 0$  .
- (4) استنتج قيمة  $\cos \frac{11\pi}{12}$  و  $\sin \frac{11\pi}{12}$  .

### الحل

- (1) حساب الجذور التكعيبية للعدد  $L = -2 + 2i$
$$L = -2 + 2i = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

إذا كان  $\beta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  جذرا تكعيبيا للعدد  $L$  فإن

$$\beta^3 = L$$



يكافئ (  $r^3 = 1$  و  $\theta = \frac{2K\pi}{3}$  حيث  $K \in \{0,1,2\}$  ) ومنه :

$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} =$$

$$= \cos \left( \pi + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( \pi + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

إذن الجذور التكعيبية للعدد 1 هي:

$$\alpha_2 = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \alpha_1 = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \alpha_0 = 1$$

(3) حل المعادلة  $z^3 + 2(1-i) = 0$ .

$$z^3 + 2(1-i) = 0 \text{ ومنه : } z^3 = -2 + 2i = (1+i)^3 \text{ ومنه}$$

$$\text{ومنه : } \left( \frac{z}{1+i} \right)^3 = 1 \text{ إذن } \frac{z}{1+i} \text{ جذرا تكعيبيا للعدد 1. ومنه :}$$

$$\frac{z}{1+i} = 1 \text{ أو } \frac{z}{1+i} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ أو } \frac{z}{1+i} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{z}{1+i} = 1 \text{ ومنه : } z = 1+i$$

$$\frac{z}{1+i} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ومنه :}$$

$$z = (1+i) \left( -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) i$$

$$\frac{z}{1+i} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ومنه :}$$

$$z = (1+i) \left( -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) i$$

(4) استنتاج قيمة  $\cos \frac{11\pi}{12}$  و  $\sin \frac{11\pi}{12}$ .

لدينا  $L = -2 + 2i = z^3$  ومنه  $z$  جذرا تكعيبيا للعدد  $L$ ، إذن حلول هذه المعادلة  $z_0, z_1, z_2$  هي الجذور التكعيبية للعدد  $L$

$$\text{لدينا } z_0 = 1+i, \quad z_1 = \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) i$$

$$z_2 = \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) i$$

ونعلم أن الجذور التكعيبية للعدد  $L$  على الشكل المثلثي هي:

$$\beta_0 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\beta_1 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

$$\beta_2 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{19\pi}{12} + i \sin \frac{19\pi}{12} \right)$$



$$= \alpha^2(-8+6i) + 8\alpha^2 - 8\alpha^2 i$$

$$= -2\alpha^2 i = \alpha^2(-2i) = \alpha^2(1-i)^2$$

$$z_1 = \frac{\alpha(1+3i) + \alpha(1-i)}{2} = \alpha + \alpha i = \alpha(1+i) : \text{ومنه}$$

$$z_2 = \frac{\alpha(1+3i) - \alpha(1-i)}{2} = 2\alpha i$$

(2) أ - كتابة  $z_1$  و  $z_2$  على الشكل المثلثي .

$$|z_1| = |\alpha(1+i)| = |\alpha||1+i| = r\sqrt{2}$$

$$\arg(z_1) \equiv \arg[\alpha(1+i)] \equiv \arg(\alpha) + \arg(1+i)$$

$$\equiv \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)[2\pi]$$

$$z_1 = r\sqrt{2} \left[ \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] : \text{ومنه}$$

$$|z_2| = |2\alpha i| = |\alpha||2i| = 2r$$

$$\arg(z_2) \equiv \arg[2\alpha i] \equiv \arg(\alpha) + \arg(2i)$$

$$\equiv \left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)[2\pi]$$

$$z_2 = 2r \left[ \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \right] : \text{ومنه}$$

ب - تعيين  $r$  و  $\theta$  بحيث يكون  $z_1 = z_2^2$  .

نعلم أن  $\cos \frac{11\pi}{12} < 0$  و  $\sin \frac{11\pi}{12} > 0$  ومنه :

$$\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

$$\sin \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} , \quad \cos \frac{11\pi}{12} = \frac{-\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} : \text{ومنه}$$

$$\sin \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} , \quad \cos \frac{11\pi}{12} = \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} : \text{إذن}$$

تمرين 30

$\alpha$  عدد مركب طويلته  $r$  و عمدته  $\theta \in ]-\pi; +\pi[$

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 - \alpha(1+3i) - 2\alpha^2(1-i) = 0$

نرمز بـ  $z_1$  و  $z_2$  لحلي المعادلة حيث  $|z_2| > |z_1|$

(2) أ - أكتب  $z_1$  و  $z_2$  على الشكل المثلثي .

ب - حدد  $r$  و  $\theta$  بحيث يكون  $z_1 = z_2^2$  .

(3) نفرض أن  $\theta = \frac{\pi}{4}$  و  $r = \sqrt{2}$  . أ - عين العدد الطبيعي  $n$  لكي

يكون  $z_1^n$  تخيليا صرفا . ب - احسب  $z_2^{2000}$  .

الحل

(1) حل المعادلة :  $z^2 - \alpha(1+3i) - 2\alpha^2(1-i) = 0$

$$\Delta = \alpha^2(1+3i)^2 + 8\alpha^2(1-i)$$



$$(z_1 = z_2^2 \text{ يكافئ } |z_2^2| = |z_1| \text{ و } \arg(z_2^2) = \arg(z_1) + 2K\pi)$$

$$\text{يكافئ } (2\arg(z_2) = \arg(z_1) + 2K\pi \text{ و } 4r^2 = r\sqrt{2})$$

$$r = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ و } 2\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + 2K\pi \text{ ومنه :}$$

$$\left(\theta = -\frac{3\pi}{4} + 2K\pi \text{ و } r = \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

$$\text{وبما أن } \theta \in ]-\pi, +\pi[ \text{ فإن } r = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ و } \theta = -\frac{3\pi}{4}.$$

$$(3) \text{ أ - تعيين العدد الطبيعي } n \text{ لكي يكون } z_1^n \text{ تخيليا صرfa.}$$

$$\text{إذا كان } r = \sqrt{2} \text{ و } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ فإن : } z_1 = 2\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{و } z_2 = 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\text{ولدينا : } z_1^n = 2^n \left(\cos \frac{n\pi}{2} + i \sin \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$z_1^n \text{ تخيليا صرfa يعني حقيقي } z_1^n \text{ معدوم ومنه : } \cos \frac{n\pi}{2} = 0$$

$$\text{ومنه : } \frac{n\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + K\pi = \frac{\pi}{2}(2K+1)$$

$$. n = 2k + 1 (K \in \mathbb{N})$$

إن مجموعة الأعداد الطبيعية  $n$  لكي يكون  $z_1^n$  تخيليا صرfa هي :

$$\text{مجموعة الأعداد الفردية } n = 2k + 1 (K \in \mathbb{N}).$$

ب - حساب  $z_2^{2000}$ .

$$z_2^{2000} = (2\sqrt{2})^{2000} \left(\cos 2000 \times \frac{3\pi}{4} + i \sin 2000 \times \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$= (\sqrt{8})^{2000} (\cos 1500\pi + i \sin 1500\pi)$$

$$= 8^{1000} \times (1 + 0) = \boxed{8^{1000}}$$

### تمرين 31

$$(1) \text{ عين العدد الحقيقي } \alpha \text{ حيث : } (2 + \alpha i)^2 = 3 + 4i.$$

$$(2) \text{ حل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة : } z^2 - 2(1 - 2i)z + 3(3 + 4i) = 0$$

$$\text{نرمز لحلي المعادلة بـ } z_1 \text{ و } z_2 \text{ حيث } \operatorname{Re}(z_1) < 0.$$

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ، نعتبر النقاط

$$A, B, C \text{ ذات اللواحق على الترتيب } z_1, z_2, 5 - 5i.$$

$$(3) \text{ أ - برهن أن المثلث } ABC \text{ قائم الزاوية في } B.$$

$$\text{ب - عين لاحقة } D \text{ لكي يكون الرباعي } ABCD \text{ مستطيلا.}$$

$$(4) \text{ ليكن العدد المركب } L = \frac{z - z_2}{z - z_1}. \text{ عين مجموعة النقاط}$$

$$M(z) \text{ لكي يكون } L \text{ تخيليا صرfa.}$$

### الحل

$$(1) \text{ تعيين العدد الحقيقي } \alpha \text{ حيث : } (2 + \alpha i)^2 = 3 + 4i.$$

$$(2 + \alpha i)^2 = 3 + 4i \text{ يكافئ } (4 - \alpha^2) + 4\alpha i = 3 + 4i \text{ ومنه :}$$

$$(4 - \alpha^2 = 3 \text{ و } 4\alpha = 4) \text{ ومنه : } \alpha = 1.$$



$$L = \frac{z - z_2}{z - z_1} = \frac{(x + iy) - (3 - 6i)}{(x + iy) - (-1 + 2i)} = \frac{(x - 3) + i(y + 6)}{(x + 1) + i(y - 2)}$$

$$= \frac{[(x - 3) + i(y + 6)][(x + 1) - i(y - 2)]}{[(x + 1) + i(y - 2)][(x + 1) - i(y - 2)]}$$

$$= \frac{x^2 + y^2 - 2x + 4y - 15}{(x + 1)^2 + (y - 2)^2} + i \frac{8x + 4y}{(x + 1)^2 + (y - 2)^2}$$

$L$  تخيليا صرفا معناه حقيقي  $L = 0$  ومنه :  
 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 15 = 0$  و  $(x; y) \neq (-1; 2)$  ومنه :  
 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 - 1 - 4 - 15 = 0$   
 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 20$  : ومنه  $(x; y) \neq (-1; 2)$   
و  $(x; y) \neq (-1; 2)$  . إذن مجموعة النقط  $M$  لكي يكون  
 $L$  تخيليا صرفا هي الدائرة التي مركزها  $\omega(1; -2)$  و نصف  
قطرها  $2\sqrt{5}$  باستثناء النقطة  $(-1; 2)$  .

### تمرين 32

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 - (2 - 7i)z - 13(1 + i) = 0$   
نرمز لحلي المعادلة بـ  $z_1$  و  $z_2$  بحيث يكون الجزء الحقيقي لـ  $z_1$   
موجبا تماما .  
(2) المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس .  
و  $A$  و  $B$  صورتا العددين المركبين  $z_1$  و  $z_2$  على الترتيب .

(2) حل المعادلة  $z^2 - 2(1 - 2i)z + 3(3 + 4i) = 0$

$$\Delta' = (1 - 2i)^2 - 3(3 + 4i) = -12 - 16i = -4(3 + 4i)$$

$$= 4i^2(2 + i)^2 = [2i(2 + i)]^2 = (-2 + 4i)^2$$

$$z_1 = 1 - 2i + (-2 + 4i) = -1 + 2i \quad \text{ومنه :}$$

$$z_2 = 1 - 2i - (-2 + 4i) = 3 - 6i$$

(3) أ- البرهان بأن المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $B$  .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix} \quad \text{ومنه : } z_{\overrightarrow{AB}} = z_2 - z_1 = 4 - 8i$$

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ومنه : } z_{\overrightarrow{BC}} = (5 - 5i) - z_2 = 2 + i$$

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC} \quad \text{ومنه : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 4(2) + (-8)(1) = 0$$

فالمثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $B$  .

ب - تعيين لاحقة النقطة  $D$  .

$ABCD$  مستطيل معناه :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  يكافئ

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_{\overrightarrow{DC}} \quad \text{يكافئ } z_2 - z_1 = z_C - z_D \quad \text{ومنه :}$$

$$z_D = z_C - z_2 + z_1$$

$$z_D = (5 - 5i) - (3 - 6i) + (-1 + 2i) = 1 + 3i$$

(4) تعيين مجموعة النقط  $M(z)$  .



أ- عين المركز  $\omega$  للتشابه  $S$  الذي نسبته 2 و زاويته  $\frac{3\pi}{2}$  و الذي

يحول النقطة  $A$  إلى النقطة  $B$ .

ب - عين لاحقة  $C$  صورة النقطة  $B$  بالتشابه  $S$ .

(3) أ- عين لاحقة النقطة  $D$  مرجع الجملة

$$\{(A;1), (B;-1), (C;1)\}$$

ب - ما طبيعة الرباعي  $ABCD$  ؟

ج- عين المجموعة  $(\gamma)$  مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $z$  حيث :

$$MA^2 - MB^2 + MC^2 = K \quad (K \in \mathbb{R})$$

الحل

$$(1) \text{ حل المعادلة : } z^2 - (2-7i)z - 13(1+i) = 0$$

$$\Delta = (2-7i)^2 + 52(1+i) = 7 + 24i$$

إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $\Delta$  فإن  $\alpha^2 = \Delta$ .

$$\alpha^2 = \Delta \text{ يكافئ } \begin{cases} x^2 - y^2 = 7 \dots (1) \\ x^2 + y^2 = 25 \dots (2) \\ xy = 12 \dots (3) \end{cases} \text{ بجمع (1) و (2) نجد:}$$

$$x^2 = 16 \text{ ومنه : } (x_1 = 4 \text{ أو } x_2 = -4)$$

$$\text{بالتعويض في (3) نجد : } y_1 = 3, y_2 = -3$$

$$\text{ومنه : } \alpha_1 = 4 + 3i, \alpha_2 = -4 - 3i$$

$$\text{ومنه حلول المعادلة هي : } z_1 = \frac{(2-7i) + (4+3i)}{2} = 3 - 2i$$

$$z_2 = \frac{(2-7i) - (4+3i)}{2} = -1 - 5i$$

(2) أ - تعيين مركز التشابه  $S$  :

العبارة المركبة للتشابه  $S$  هي  $z' = \alpha z + \beta$  حيث

$$(\alpha; \beta) \in \mathbb{C}^2 \text{ و } |\alpha| \neq 1$$

$$\text{لدينا : } \alpha = 2 \left( \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = -2i$$

و لدينا :  $S(A) = B$  ومنه  $z_2 = \alpha z_1 + \beta$  ومنه :

$$\beta = z_2 - \alpha z_1$$

$$\text{اذن } \beta = (-1-5i) + 2i(3-2i) = 3 + i \text{ فيكون}$$

:  $z' = -2iz + 3 + i$  . و مركز التشابه  $S$  هي النقطة  $\omega$  ذات

$$\text{اللاحقة } \frac{3+i}{1+2i} = \frac{(3+i)(1-2i)}{5} = 1 - i$$

• - تعيين لاحقة النقطة  $C$  :

لدينا  $S(B) = C$  ومنه :

$$z_C = -2iz_2 + 3 + i$$

$$= -2i(-1-5i) + 3 + i = -7 + 3i$$

(3) أ - تعيين لاحقة النقطة  $D$  :

$$z_D = \frac{z_1 - z_2 + z_C}{1-1+1} = (3-2i) - (-1-5i) - 7 + 3i$$

$$= -3 + 6i$$

ب - طبيعة الرباعي  $ABCD$  :



$$z_{\overline{DC}} = z_C - z_D = -4 - 3i, z_{\overline{AB}} = z_2 - z_1 = -4 - 3i$$

فيكون  $\overline{AB} = \overline{DC}$

(  $AB = DC$  و  $(AB) \parallel (DC)$  ) فالرباعي  $ABCD$  فيه ضلعان متقابلان متقايسان و حاملهما متوازيان فهو متوازي الأضلاع و بما أن  $\overline{AB} \perp \overline{DC}$  فهو مستطيل .  
ج - تعيين المجموعة  $(\gamma)$  .

$$MA^2 - MB^2 + MC^2 = K \text{ ومنه :}$$

$$MD^2 + DA^2 - DB^2 + DC^2 = K$$

$$DA^2 = |z_1 - z_D|^2 = |6 - 8i|^2 = 100$$

$$DB^2 = |z_2 - z_D|^2 = |2 - 11i|^2 = 125$$

$$DC^2 = |z_C - z_D|^2 = |-4 - 3i|^2 = 25$$

$$D^2 + DA^2 - DB^2 + DC^2 = MD^2 + 100 - 125 + 25 = K$$

$$\text{ومنه : } MD^2 = K$$

إذا كان  $K > 0$  فإن المجموعة  $(\gamma)$  هي دائرة مركزها  $D$  و نصف

$$\text{قطرها } R = \sqrt{K}$$

إذا كان  $K < 0$  فإن المجموعة  $(\gamma)$  هي مجموعة خالية.

إذا كان  $K = 0$  فإن المجموعة  $(\gamma)$  هي النقطة  $D$  .

### تمرين 33

نعتبر في  $\mathbb{C}$  كثير الحدود :

$$P(z) = z^3 - 4(1 + 2i)z^2 + (-18 + 20i)z + 3(8 + 4i)$$

(1) برهن أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل حلا تخيليا صرفا  $z_0$  يطلب تعيينه .

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $P(z) = 0$  . نرسم لحلول المعادلة ب :  
 $z_0, z_1, z_2$  حيث  $|z_1| < |z_2|$  .

في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس نعتبر النقاط  $A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_0, z_1, z_2$  .

(3) أ - عين العدد الحقيقي  $\lambda$  لكي تقبل الجملة  $\{(A; \lambda), (B; -1), (C; 1)\}$  النقطة  $D$  ذات اللاحقة  $-1 + 2i$  . مرجعا .

ب - عين مجموعة النقط  $M(z)$  من المستوي التي تحقق :

$$-2MA^2 - MB^2 + MC^2 = K \quad (K \in \mathbb{R})$$

### الحل

(1) البرهان على أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل حلا تخيليا صرفا  $z_0$  .

إذا كان :  $z_0 = iy$  فإن :  $P(iy) = 0$  ومنه :

$$-iy^3 + 4y^2(1 + 2i) + iy(-18 + 20i) + 3(8 + 4i) = 0$$

$$\begin{cases} -y^3 + 8y^2 - 18y + 12 = 0 \dots (1) \\ 4y^2 - 20y + 24 = 0 \dots (2) \end{cases} \text{يكافئ}$$

المعادلة (2) تقبل حلين  $y_1 = 2$  أو  $y_2 = 3$  حيث  $y_1$  يحقق

المعادلة (1) فهو الحل المقبول أما  $y_2$  فهو مرفوض لأنه لا يحقق

المعادلة (1) ومنه  $z_0 = 2i$  .



(2) حل المعادلة  $P(z) = 0$ .

$$\begin{aligned} P(z) &= (z - 2i)(z^2 + az + c) \\ &= z^3 + (a - 2i)z^2 + (c - 2ai)z - 2ci \\ &\begin{cases} a - 2i = -4(1 + 2i) \\ c - 2ai = -18 + 20i : \text{بالمطابقة نجد} \\ -2ci = 3(8 + 4i) \end{cases} \\ &\begin{cases} a = -4 - 6i \\ c = -6 + 12i \end{cases} \text{ومنه:} \end{aligned}$$

$P(z) = 0$  يكافئ

$$(z - 2i)[z^2 - (4 + 6i)z - 6 + 12i] = 0$$

ومنه :  $z_0 = 2i$  أو  $z^2 - (4 + 6i)z - 6 + 12i = 0$

$$\Delta' = (2 + 3i)^2 - (-6 + 12i) = (-5 + 12i) + 6 - 12i = 1$$

ومنه :  $z_1 = (2 + 3i) - 1 = 1 + 3i$

وبالتالي حلول  $z_2 = (2 + 3i) + 1 = 3 + 3i$

المعادلة  $P(z) = 0$  هي:

$$z_2 = 3 + 3i, z_1 = 1 + 3i, z_0 = 2i$$

(3) أ - تعيين العدد الحقيقي  $\lambda$ .

لكي تقبل الجملة  $\{(A; \lambda), (B; -1), (C; 1)\}$  مرجعا يجب أن

يكون  $\lambda + (-1) + (+1) \neq 0$  ومنه:  $\lambda \neq 0$ .

تكون النقطة  $D(1 - 2i)$  مرجعا لهذه الجملة إذا كان

$$z_D = \frac{\lambda z_0 - z_1 + z_2}{\lambda} \text{ ومنه:}$$

$$-1 + 2i = \frac{2\lambda i - (1 + 3i) + 3 + 3i}{\lambda} \text{ ومنه:}$$

$$\lambda(-1 + 2i) = 2\lambda i + 2 \text{ ومنه } \lambda = -2.$$

ب- تعيين مجموعة النقط  $M(z)$

$$-2MA^2 - MB^2 + MC^2 = K \text{ ومنه:}$$

$$-2MD^2 - 2DA^2 - DB^2 + DC^2 = K$$

$$DB^2 = |z_1 - z_D|^2 = |2 + i|^2 = 5, DA^2 = |z_0 - z_D|^2 = 1$$

$$DC^2 = |z_2 - z_D|^2 = |4 + i|^2 = 17$$

$$-2MD^2 - 2 - 5 + 17 = K \text{ ومنه:}$$

$$MD^2 = \frac{10 - K}{2}$$

إذا كان  $K < 10$  فإن مجموعة النقط  $M$  هي دائرة مركزها  $D$

$$R = \sqrt{\frac{10 - K}{2}} \text{ ونصف قطرها}$$

إذا كان  $K = 10$  فإن مجموعة النقط  $M$  هي النقطة  $D$ .

إذا كان  $K > 10$  فإن مجموعة النقط  $M$  هي مجموعة خالية.



### تمرين 34

نعتبر الأعداد المركبة :  $z_1 = 1 + i$  ،  $z_2 = 2(-1 + i)$  ،

$$z_3 = -3 - i$$

(1) أ - احسب  $z_1^{2002}$  .

ب - عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z_2^n \in \mathbb{R}_+^*$  .

(2) نعتبر في المستوى المزود بمعلم متعامد و متجانس النقط

$A$  ،  $B$  ،  $C$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_1$  ،  $z_2$  ،  $z_3$  .

أ -  $\lambda$  عدد حقيقي ، عين  $E$  مجموعة قيم  $\lambda$  لكي تقبل الجملة

$$\{(A; \lambda), (B; 1), (C; 1)\}$$

ب - عين مجموعة النقط  $G_\lambda$  عندما  $\lambda \in E$  .

(3) نعتبر الدوران  $R$  الذي يحول النقطة  $A$  إلى  $B$  والنقطة

$B$  إلى  $C$  .

أ - عين العناصر المميزة للدوران  $R$  .

ب - عين لاحقة النقطة  $A'$  صورة النقطة  $A$  بالدوران  $R$  .

الحل

(1) حساب  $z_1^{2002}$  .

$$z_1 = 1 + i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ ومنه :}$$

$$\begin{aligned} z_1^{2002} &= 2^{1001} \left[ \cos \left( 2002 \times \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( 2002 \times \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= 2^{1001} \left[ \cos \left( \frac{\pi}{2} + 500\pi \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} + 500\pi \right) \right] \end{aligned}$$

$$= 2^{1001} \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 2^{1001} i$$

ب - تعيين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z_2^n \in \mathbb{R}_+^*$  .

$$z_2 = 2(-1 + i) = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \text{ ومنه :}$$

$$z_2^n = (2\sqrt{2})^n \left( \cos \frac{3\pi}{4} \times n + i \sin \frac{3\pi}{4} \times n \right)$$

$$z_2^n \in \mathbb{R}_+^* \text{ يكافئ } \begin{cases} \sin \frac{3\pi \times n}{4} = 0 \\ \cos \frac{3\pi \times n}{4} > 0 \end{cases} \text{ يكافئ}$$

$$\frac{3\pi \times n}{4} = 2K\pi \text{ ومنه } 3n = 8K \text{ حيث } K \in \mathbb{N}$$

( حسب نظرية غوس فإن 8 تقسم  $n$  ( أي  $n$  من مضاعفات 8 ) )

(2) أ - تعيين مجموعة قيم  $\lambda$  .

لكي تقبل الجملة  $\{(A; \lambda), (B; 1), (C; 1)\}$  مرجعا يجب أن يكون

$$\lambda + 1 + 1 \neq 0 \text{ أي } \lambda \neq -2 \text{ ومنه } E = \mathbb{R} - \{-2\} .$$

ب - تعيين مجموعة النقط  $G_\lambda$  عندما  $\lambda \in E$  .

$$z_{G_\lambda} = \frac{\lambda z_1 + z_2 + z_3}{\lambda + 2} \text{ فإن } \lambda \in E \text{ حيث :}$$



$$z_{G_\lambda} = \frac{\lambda-5}{\lambda+2} + i \frac{\lambda+1}{\lambda+2} = \left(1 - \frac{7}{\lambda+2}\right) + i \left(1 - \frac{1}{\lambda+2}\right)$$

ومنه :  $G_\lambda \left(1 - \frac{7}{\lambda+2}; 1 - \frac{1}{\lambda+2}\right)$  فيكون

$$\begin{cases} x_G = 1 - \frac{7}{\lambda+2} \dots (1) \\ y_G = 1 - \frac{1}{\lambda+2} \dots (2) \end{cases}$$

بضرب المعادلة (2) في (-7) ثم

بجمع المعادلتين نجد :  $x_G - 7y_G - 6 = 0$

فتكون مجموعة النقط  $G_\lambda$  عندما  $\lambda \in E$  هي المستقيم (D) ذو

المعادلة :  $x - 7y - 6 = 0$

(3) أ - تعيين العناصر المميزة للدوران  $R$ .

نعلم أن عبارة الدوران  $R$  هي من الشكل  $z' = \alpha z + \beta$  حيث :

$$(\alpha; \beta) \in \mathbb{C}^2 \text{ و } |\alpha| = 1$$

$$\text{لدينا : } \begin{cases} R(A) = B \\ R(B) = C \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} z_2 = \alpha z_1 + \beta \\ z_3 = \alpha z_2 + \beta \end{cases} \text{ و منه :}$$

$$\alpha = \frac{z_3 - z_2}{z_2 - z_1} = \frac{-1 - 3i}{-3 + i} \text{ و منه : } z_3 - z_2 = \alpha (z_2 - z_1)$$

$$\text{ومنه : } \alpha = \frac{(-1 - 3i)(-3 - i)}{10} = i$$

$$\text{لدينا : } z_2 = \alpha z_1 + \beta \text{ و منه } \beta = z_2 - \alpha z_1 = -1 + i$$

إذن عبارة الدوران  $R$  هي  $z' = iz - 1 + i$

العناصر المميزة للدوران  $R$  هي الزاوية :  $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$

$$\text{و المركز النقطة ذات اللاحقة } -1 \text{ و } \frac{-1+i}{1-i} = -\frac{1-i}{1-i}$$

ب - تعيين لاحقة النقطة  $A'$  صورة النقطة  $A$ .

لدينا :  $R(A) = A'$  و منه :

$$z_{A'} = iz_A - 1 + i = i(1+i) - 1 + i = -2 + 2i$$

### تمرين 35

نعتبر الأعداد المركبة :  $-4i$  ،  $-2$  ،  $-2-2i$

(1) رتب هذه الأعداد المركبة لكي تشكل 3 حدود متتابعة لمتتالية

هندسية أساسها  $(1+i)$ .

(2) نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  المتتالية  $(z_n)$  المعرفة بحددها الأول

$$z_0 = -1 - i \text{ و أساسها } (1+i)$$

أ - احسب  $z_1$  ،  $z_2$  ،  $z_3$ . ب - احسب بدلالة  $n$  الحد العام  $z_n$ .

ج - أكتب  $z_n$  على الشكل المثلثي ثم استنتج مجموعة قيم العدد

الطبيعي  $n$  التي من أجلها  $z_n \in \mathbb{R}$ .

(3) في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد ومتجانس نعتبر

التحويل  $S$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$  حيث

$$z' = (-1-i)z + (4+2i):$$

أ - ما طبيعة التحويل  $S$  وما هي عناصره المميزة ؟



ب- برهن أن التحويل  $T = S \circ S \circ S \circ S$  هو تحاكي يطلب تعيين عناصره.

### الحل

(1) ترتيب الأعداد المركبة  $-2-2i$  ،  $-2$  ،  $-4i$  لكي تشكل ثلاثة حدود متتالية لمتتالية هندسية.

$$\text{لدينا : } (-2-2i)^2 = 8i \text{ و } (-2)(-4i) = 8i$$

و بما أن  $(-2-2i)^2 = (-2)(-4i)$  (الوسط الهندسي) فإن

الحد  $-2-2i$  هو الحد الوسط ، و يكون الترتيب كما يلي :  
 $-2$  ،  $-4i$  ،  $-2-2i$  . أو  $-2$  ،  $-2-2i$  ،  $-4i$  . ويكون أساس

المتتالية في الترتيب الأول :  $\frac{-2-2i}{-2} = 1+i$  وهو المطلوب .

إذن ترتيب الحدود هو :  $-2$  ،  $-2-2i$  ،  $-4i$  .

(2) أ - حساب  $z_1$  ،  $z_2$  ،  $z_3$  :

$$z_1 = (1+i)z_0 = (1+i)(-1-i) = -2i$$

$$z_2 = (1+i)z_1 = (1+i)(-2i) = 2-2i$$

$$z_3 = (1+i)z_2 = (1+i)(2-2i) = 4$$

ب - حساب  $z_n$  بدلالة  $n$  :

$$z_n = z_0(1+i)^n = (-1-i)(1+i)^n$$

ج - كتابة  $z_n$  على الشكل المثلثي ثم استنتاج مجموعة قيم العدد الطبيعي  $n$  .

$$|z_n| = |-1-i| \times |1+i|^n = \sqrt{2} \times (\sqrt{2})^n = (\sqrt{2})^{n+1}$$

$$\arg(z_n) \equiv \arg(-1-i) + \arg(1+i)^n$$

$$\equiv \frac{5\pi}{4} + n \times \arg(1+i) \equiv \frac{5\pi}{4} + \frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{4}(5+n)[2\pi]$$

$$\text{ومنه : } z_n = \sqrt{2^{n+1}} \left[ \cos \frac{(5+n)\pi}{4} + i \sin \frac{(5+n)\pi}{4} \right]$$

$$z_n \in \mathbb{R} \text{ يكافئ } \sin \frac{\pi}{4}(5+n) = 0 \text{ ومنه : } \frac{\pi}{4}(5+n) = K\pi$$

ومنه :  $5+n = 4K$  ومنه  $n = 4K - 5$  حيث :

$K \in \mathbb{N}$  و  $K \geq 2$  .

(3) أ - طبيعة التحويل  $S$  و عناصره المميزة .

لدينا  $z' = (-1-i)z + (4+2i)$  و بما أن  $|-1-i| = \sqrt{2}$

و  $\arg(-1-i) \equiv \frac{5\pi}{4}[2\pi]$  فالتحويل  $S$  هو تشابه نسبته  $\sqrt{2}$

و زاويته  $\frac{5\pi}{4}$  ومركزه النقطة  $\omega$  ذات اللاحقة

$$\frac{4+2i}{1-(-1-i)} = \frac{4+2i}{2+i} = 2 \text{ ومنه : } \omega(2;0) .$$

ب- البرهان على أن  $T = S \circ S \circ S \circ S$  هو تحاكي يطلب تعيين عناصره.

نعلم أن تركيب  $n$  مرة التشابه  $S$  الذي مركزه  $\omega$  ونسبته  $K$  و زاويته  $\theta$  هو تشابه مركزه  $\omega$  ونسبته  $K^n$  و زاويته  $n \times \theta$  .

فيكون  $T = S \circ S \circ S \circ S$  هو تشابه مركزه  $\omega$  ونسبته



$(\sqrt{2})^4$  و زاويته  $4 \times \frac{5\pi}{4} = 5\pi$ . والتشابه الذي زاويته  $K\pi$   
يعتبر تحاكي. فالتحويل  $T$  هو تحاكي مركزه  $\omega$  ونسبته  $4 = (\sqrt{2})^4$

### تمرين 36

نعتبر العددين المركبين :

$$L = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + (\sqrt{6} + \sqrt{2})i \quad \text{و} \quad z = -8(\sqrt{3} - i)$$

(1) أ - احسب طولية وعمدة  $z$  . ب - احسب  $z^{2002}$  .

ج - عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z^n \in \mathbb{R}$  .

(2) أ - احسب  $L^2$  . ب - استنتج قيمة  $\cos \frac{5\pi}{12}$  و  $\sin \frac{5\pi}{12}$  .

(3) نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة :

$$z^2 + 2(\sqrt{3} - 2i)z - 16(7 - 5\sqrt{3}i) = 0$$

- تحقق أن  $z = -8(\sqrt{3} - i)$  هو جذر للمعادلة ثم استنتج الجذر الآخر.

### الحل

(1) أ - حساب طولية وعمدة  $z$  .

$$|z| = |-8(\sqrt{3} - i)| = 16$$

$$\arg(z) \equiv \arg[-8(\sqrt{3} - i)] \equiv \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$$

ب - حساب  $z^{2002}$  . لدينا  $z = 16\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$

$$\begin{aligned} z^{2002} &= 16^{2002} \left( \cos \frac{5\pi}{6} \times 2002 + i \sin \frac{5\pi}{6} \times 2002 \right) \\ &= 16^{2002} \left[ \cos \left( 1668\pi + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( 1668\pi + \frac{\pi}{3} \right) \right] \\ &= 16^{2002} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 16^{2002} \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \end{aligned}$$

ج - تعيين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z^n \in \mathbb{R}$  .

$$z^n = 16^n \left( \cos \frac{5\pi}{6} \times n + i \sin \frac{5\pi}{6} \times n \right)$$

$$\frac{5\pi}{6} \times n = K\pi \quad \text{ومنه} \quad \sin \frac{5\pi}{6} \times n = 0$$

ومنه :  $5n = 6K$  حيث :  $K \in \mathbb{N}$  .

و بتطبيق نظرية غوص نجد :  $n = 6h$  ،  $(h \in \mathbb{N})$  .

(2) أ - حساب  $L^2$  .

$$L = [(\sqrt{6} - \sqrt{2}) + (\sqrt{6} + \sqrt{2})i]^2 = -8\sqrt{3} + 8i = z$$

ومنه  $L$  هو جذر تربيعي للعدد المركب  $z$  .

ب - استنتج قيمة  $\cos \frac{5\pi}{12}$  و  $\sin \frac{5\pi}{12}$  .

لنعين أولا الجذور التربيعية للعدد المركب  $z$  على الشكل المثلثي .

إذا كان  $\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $z$

فإن  $\alpha^2 = z$  .



$$= (128 - 16 - 112) + i(-128\sqrt{3} + 48\sqrt{3} + 80\sqrt{3}) = 0$$

إذن  $z = -8(\sqrt{3} - i)$  هو جذر للمعادلة .

نعلم أن مجموع جذري معادلة من الدرجة الثانية

$$az^2 + bz + c = 0 \text{ يساوي } -\frac{b}{a} . \text{ ومنه فإن}$$

$$z' + z = -2(\sqrt{3} - 2i) \text{ ومنه :}$$

$$z' - 8(\sqrt{3} - 0i) = -2(\sqrt{3} - 2i) \text{ فيكون } z' = 6\sqrt{3} - 4i .$$

### تمرين 37

نعتبر كثير الحدود التالي:

$$P(z) = z^3 + (8 - 10i)z^2 - (20 + 48i)z - 64 + 8i$$

(1) برهن أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا تخيليا صرفا  $z_0$  يطلب تعيينه.

(2) أ - حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $P(z) = 0$ .

نرمز بـ  $z_0, z_1, z_2$  لحلول المعادلة حيث  $|z_2| > |z_1|$ .

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقاط

$M_0, M_1, M_2$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_0, z_1, z_2$ .

ب - برهن على وجود تشابه  $S$  الذي يحول  $M_0$  إلى  $M_1$  و يحول

$M_1$  إلى  $M_2$ .

ج - عين العناصر المميزة للتشابه  $S$ .

د - أكتب العبارة التحليلية للتشابه  $S$ .

$$\alpha^2 = z \text{ ومنه :}$$

$$r^2 (\cos 2\theta + i \sin 2\theta) = 16 \left( \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \text{ ومنه :}$$

$$(r^2 = 16 \text{ و } 2\theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi) \text{ ومنه :}$$

$$(K \in \{0; 1\} \text{ مع } \theta = \frac{5\pi}{12} + k\pi \text{ و } r = 4)$$

$$\text{ومنه : } \alpha_0 = 4 \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\alpha_1 = 4 \left( \cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right)$$

بما أن  $(\text{Re}) L > 0$  و  $(\text{Im}) L > 0$  فإن  $L = \alpha_0$  ومنه

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2}) + (\sqrt{6} + \sqrt{2})i = 4 \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\text{ومنه : } \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ و } \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

(3) التحقق من أن  $z = -8(\sqrt{3} - i)$  هو جذر للمعادلة :

$$\text{لدينا } z^2 + 2(\sqrt{3} - 2i)z - 16(7 - 5\sqrt{3}i) = 0 \text{ ومنه :}$$

$$64(\sqrt{3} - i)^2 - 16(\sqrt{3} - 2i)(\sqrt{3} - i) - 16(7 - 5\sqrt{3}i)$$

$$= 64(2 - 2\sqrt{3}i) - 16(1 - 3\sqrt{3}i) - 16(7 - 5\sqrt{3}i)$$



### الحل

(1) البرهان على أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا تخيليا صرفا  $z_0$

ليكن  $z_0 = iy$  حلا للمعادلة  $P(z) = 0$  ومنه  $P(iy) = 0$

ومنه  $P(iy) = 0$

$$-8y^2 + 48y - 64 + (-y^3 + 10y^2 - 20y + 8)i = 0$$

$$\begin{cases} -8y^2 + 48y - 64 = 0 & \dots(1) \\ -y^3 + 10y^2 - 20y + 8 = 0 & \dots(2) \end{cases}$$

المعادلة (1) تقبل حلين  $y_1 = 2$  (مقبول) و  $y_2 = 4$

(مرفوض لأنه لا يحقق المعادلة (2) ومنه  $z_0 = 2i$  .

(2) أ - حل المعادلة  $P(z) = 0$

$$P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + c)$$

$$= z^3 + (a - 2i)z^2 + (c - 2ai)z - 2ci$$

بالمطابقة نجد :  $a = 8 - 8i$  ،  $c = -4 - 32i$  .

$$P(z) = 0 \text{ يكافئ } (z - 2i)[z^2 + (8 - 8i)z - 4 - 32i] = 0$$

يكافئ  $z = 2i$  أو  $z^2 + (8 - 8i)z - 4 - 32i = 0$  .

$$\Delta' = (4 - 4i)^2 - (-4 - 32i) = 4$$

ومنه :

$$z_1 = -(4 - 4i) + 2 = -2 + 4i$$

$$z_2 = -(4 - 4i) - 2 = -6 + 4i$$

إذن حلول المعادلة هي :

$$z_2 = -6 + 4i \text{ ، } z_1 = -2 + 4i \text{ ، } z_0 = 2i$$

ب - البرهان على وجود تشابه  $S$  الذي يحول  $M_0$  إلى  $M_1$

ويحول  $M_1$  إلى  $M_2$  .

نعلم أن عبارة التشابه  $S$  هي  $z' = \alpha z + \beta$  حيث  $(\alpha; \beta) \in \mathbb{C}^2$

و  $|\alpha| \neq 1$  .

لدينا :

$$\begin{cases} z_1 = \alpha z_0 + \beta & \dots(1) \\ z_2 = \alpha z_1 + \beta & \dots(2) \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} S(M_0) = M_1 \\ S(M_1) = M_2 \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{z_2 - z_1}{z_1 - z_0} = 1 + i \text{ ومنه } z_2 - z_1 = \alpha(z_1 - z_0)$$

و بالتعويض نجد :  $\beta = z_1 - \alpha z_0 = 2i$  .

إذن يوجد تشابه  $S$  معرف بـ  $z' = (1 + i)z + 2i$  يحول النقطة

$M_0$  إلى  $M_1$  ويحول  $M_1$  إلى  $M_2$  .

ج - العناصر المميزة للتشابه  $S$  .

عناصر المميزة للتشابه  $S$  هي النسبة و تساوي  $|1 + i| = \sqrt{2}$

و الزاوية وهي  $\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$  و المركز وهو النقطة الصامدة

$$\text{ذات اللاحقة } -2 = \frac{2i}{1 - (1 + i)}$$

د - العبارة التحليلية للتشابه  $S$  .

لدينا  $z' = (1 + i)z + 2i$  ومنه :



$$x' + iy' = (1+i)(x+iy) + 2i = x - y + i(x+y+2)$$

ومنه :  $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + y + 2 \end{cases}$  وهي العبارة التحليلية للتشابه  $S$ .

### تمرين 38

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^3 - (1+i)z^2 - 2(1+i)z + 8 = 0$   
 علما أنها تقبل حلا حقيقيا  $z_0$ . نرسم  $z_0, z_1, z_2$  لحلول المعادلة حيث  $|z_1| < |z_2|$ .

(2) أ- احسب  $\left(\frac{z_1}{\sqrt{2}}\right)^{2000} + \left(\frac{z_2}{2\sqrt{2}}\right)^{2004}$

ب- عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z_1^n \in \mathbb{R}_+$ .

(3) في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقاط  $A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_0, z_1, z_2$ .

أ- عين لاحقة  $G$  مركز ثقل المثلث  $ABC$ .

ب- عين مجموعة النقاط  $M(z)$  بحيث :

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = K, (K \in \mathbb{R})$$

### الحل

(1) أ- البرهان على أن المعادلة تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$ .  
 ليكن  $z_0 = x$  حلا للمعادلة ومنه :

$$x^3 - (1+i)x^2 - 2(1+i)x + 8 = 0$$

$$(x^3 - x^2 - 2x + 8) + i(-x^2 - 2x) = 0$$

$$\begin{cases} x^3 - x^2 - 2x + 8 = 0 & \dots (1) \\ -x^2 - 2x = 0 & \dots (2) \end{cases}$$

المعادلة (2) تقبل حلين  $x_1 = 0$  (مرفوض) و  $x_2 = -2$  مقبول لأنه يحقق المعادلة (1).

ومنه :  $z_0 = -2$ .

ب- حل المعادلة :

$$(z+2)(z^2 + az + c) = z^3 + (a+2)z^2 + (c+2a)z + 2c$$

بالمطابقة نجد :  $\begin{cases} a+2 = -1-i \\ c+2a = -2(1+i) \\ 2c = 8 \end{cases}$  ومنه  $\begin{cases} a = -3-i \\ c = 4 \end{cases}$

$$P(z) = 0 \text{ ومنه : } (z+2)[z^2 - (3+i)z + 4] = 0$$

$$z^2 - (3+i)z + 4 = 0 \text{ أو } z = -2$$

المعادلة الثانية من الدرجة الثانية مميزها

$$\Delta = (3+i)^2 - 16 = -8 + 6i$$

والجذور التربيعية للعدد  $\Delta$  هي :

$$\alpha_1 = 1+3i \text{ و } \alpha_2 = -1-3i$$

$$z_1 = \frac{(3+i) - (1+3i)}{2} = 1-i \text{ : ومنه :}$$

$$z_2 = \frac{(3+i) + (1+3i)}{2} = 2(1+i)$$



$$Z_G = \frac{z_0 + z_1 + z_2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i$$

ب- تعيين مجموعة النقط

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = K : M(z)$$

نعلم أن :

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$$

$$GB^2 = |z_1 - z_G|^2 = \frac{20}{9} \quad , \quad GA^2 = |z_0 - z_G|^2 = \frac{50}{9}$$

$$GC^2 = |z_2 - z_G|^2 = \frac{50}{9}$$

$$. MG^2 = \frac{1}{3} \left( K - \frac{40}{3} \right) \quad \text{إذن } 3MG^2 = K - \frac{40}{3} \text{ ومنه :}$$

إذا كان  $K > \frac{40}{3}$  فإن مجموعة النقط  $M$  هي دائرة مركزها  $G$

$$. R = \sqrt{\frac{1}{3} \left( K - \frac{40}{3} \right)} \text{ ونصف قطرها}$$

إذا كان  $K < \frac{40}{3}$  فإن مجموعة النقط  $M$  هي مجموعة خالية.

إذا كان  $K = \frac{40}{3}$  فإن مجموعة النقط  $M$  هي النقطة  $G$ .

تمرين 39

ليكن كثير الحدود  $P(z) = z^3 + z^2 + (-5 + 4i)z - 21 - 12i$

$$(2) \quad \text{أ - حساب} \quad \left( \frac{z_1}{\sqrt{2}} \right)^{2000} + \left( \frac{z_2}{2\sqrt{2}} \right)^{2004}$$

$$, z_1 = \sqrt{2} \left[ \cos \left( \frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left( \frac{-\pi}{4} \right) \right]$$

$$. z_2 = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\left( \frac{z_1}{\sqrt{2}} \right)^{2000} + \left( \frac{z_2}{2\sqrt{2}} \right)^{2000} = \cos \frac{-\pi}{4} \times 2000 + i \sin \frac{-\pi}{4} \times 2000$$

$$+ \cos \frac{\pi}{4} \times 2004 + i \sin \frac{\pi}{4} \times 2004$$

$$(\cos 500\pi - i \sin 500\pi) + (\cos 501\pi + i \sin 501\pi)$$

$$(1 - 0) + (-1 + 0) = 0$$

ب - تعيين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $z_1^n \in \mathbb{R}_+^*$

$$. z_1^n = \sqrt{2}^n \left[ \cos \left( \frac{-n\pi}{4} \right) + i \sin \left( \frac{-n\pi}{4} \right) \right]$$

$$\frac{n\pi}{4} = (2K + 1)\pi \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} -\sin \frac{n\pi}{4} = 0 \\ \cos \frac{n\pi}{4} < 0 \end{cases} \quad \text{يكافئ } z_1^n \in \mathbb{R}_+^*$$

ومنه :  $n = 4(1 + 2K) = 8K + 4$  حيث  $(K \in \mathbb{N})$

(3) أ - تعيين لاحقة  $G$  مركز ثقل المثلث  $ABC$ .



1- أ) برهن أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$  يطلب تعيينه .  
 ب) حل المعادلة  $P(z) = 0$ .

ولتكن  $z_0, z_1, z_2$  جذورها حيث  $|z_1| < |z_2|$ .

2) نعتبر في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد ومتجانس النقاط  $A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_0, z_1, z_2$ .

أ) عين طبيعة المثلث  $ABC$ .

ب) عين لاحقة النقطة  $G$  مركز ثقل المثلث.

ج) عين مجموعة النقط  $M(z)$  حيث :

$$|z - z_0|^2 + |z - z_1|^2 + |z - z_2|^2 = \frac{267}{9}$$

3) عين العناصر المميزة للتشابه  $S$  الذي مركزه  $A$  ويحول النقطة  $B$  إلى  $C$ .

### الحل

1) البرهان على أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$ .

إذا كان  $z_0 = x$  جذرا للمعادلة  $P(z) = 0$  فإن  $P(x) = 0$

$$P(x) = 0 \text{ يكافئ } x^3 + x^2 + (-5 + 4i)x - 21 - 12i = 0$$

ومنه :  $(x^3 + x^2 - 5x - 21) + i(4x - 2) = 0$  ومنه :

$$\begin{cases} x^3 + x^2 - 5x - 21 = 0 \\ 4x - 12 = 0 \end{cases}$$

ومنه :  $x = 3$  أي  $z_0 = 3$

ب) حل المعادلة  $P(z) = 0$

$$P(z) = (z - 3)(z^2 + Az + C) = z^3 + (A - 3)z^2 + (C - 3A)z - 3C$$

$$\begin{cases} A - 3 = 1 \\ C - 3A = -5 + 4i \\ -3C = -21 - 12i \end{cases}$$

ومنه :  $A = 4, C = 7 + 4i$

$$P(z) = 0 \text{ يكافئ } (z - 3)(z^2 + 4z + 7 + 4i) = 0$$

ومنه :  $z = 3$  أو  $z^2 + 4z + 7 + 4i = 0$   
 المعادلة الثانية من الدرجة الثانية مميزها

$$\Delta' = 4 - 7 - 4i = -3 + 4i$$

إذا كان  $\alpha = x + iy$  جذرا تربيعيا للعدد المركب  $\Delta'$  فإن  $\alpha^2 = \Delta'$  ومنه :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -3 & \dots (1) \\ x^2 + y^2 = 5 & \dots (2) \\ xy = 2 & \dots (3) \end{cases} \alpha^2 = \Delta' \text{ يكافئ}$$

ومنه :  $\alpha_1 = 1 + 2i, \alpha_2 = -1 - 2i$  ومنه حلول المعادلة

$$z_1 = -2 + (1 + 2i) = -1 + 2i, z_0 = 3$$

$$z_2 = -2 - (1 + 2i) = -3 - 2i$$

2- أ) طبيعة المثلث  $ABC$



$$MG^2 = 1 \text{ يكافئ } 3MG^2 + \frac{100}{9} + \frac{40}{9} + \frac{100}{9} = \frac{267}{9}$$

إن مجموعة النقط  $M$  هي الدائرة  $(C)$  التي مركزها  $G$  ونصف قطرها 1.

(3) تعيين العناصر المميزة للتشابه  $S$ .

نعلم أن عبارة التشابه  $S$  هي  $z' = \alpha z + \beta$  ولدينا

$$z_0 = \alpha z_0 + \beta \text{ ومنه } S(A) = A \text{ و } S(B) = C$$

$$\text{و } z_2 = \alpha z_1 + \beta \text{ فتكون : } z_2 - z_0 = \alpha(z_1 - z_0)$$

$$\text{ومنه : } \alpha = \frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0} = 1 + i$$

$$\beta = z_0 - \alpha z_0 = 3 - 3(1 + i) = -3i$$

$$\text{ومنه : } z' = (1 + i)z - 3i$$

فالتحويل  $S$  هو تشابه نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته هي :

$$\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} \text{ ومركزه } A.$$

#### تمرين 40

نعتبر كثير الحدود  $P(z) = z^4 + 17z^2 - 28z + 260$  حيث  $z$  عدد

مركب .

(1) عين العددين الحقيقيين  $A$  و  $B$  بحيث :

$$P(z) = (z^2 + Az + B)(z^2 + 4z + 20)$$

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $P(z) = 0$ .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ ومنه } Z_{\overrightarrow{AB}} = z_1 - z_0 = -4 + 2i$$

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ ومنه } Z_{\overrightarrow{BC}} = z_2 - z_1 = -2 - 4i$$

$$BC = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20}, AB = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{20}$$

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC} \text{ إذن } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (-4)(-2) + (2)(-4) = 0$$

ومنه فالمثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $B$  ومتساوي الساقين .

(ب) تعيين لاحقة  $G$  مركز ثقل المثلث  $ABC$ .

$$z_G = \frac{z_0 + z_1 + z_2}{3} = \frac{3 + (-1 + 2i) + (-3 - 2i)}{3} = -\frac{1}{3}$$

(ج) تعيين مجموعة النقط  $M(z)$ .

$$|z - z_0|^2 + |z - z_1|^2 + |z - z_2|^2 = \frac{267}{9} \text{ ومنه :}$$

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{267}{9} \text{ ومنه :}$$

$$3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{267}{9}$$

$$\text{حيث : } GA^2 = \left| z_0 + \frac{1}{3} \right|^2 = \frac{100}{9}, GB^2 = \left| z_1 + \frac{1}{3} \right|^2 = \frac{40}{9}$$

$$GC^2 = \left| z_2 + \frac{1}{3} \right|^2 = \frac{100}{9} \text{ ومنه :}$$



$$P(z) = 0 \text{ يكافئ } (z^2 - 4z + 13)(z^2 + 4z + 20) = 0$$


$$z^2 - 4z + 13 = 0 \text{ أو } z^2 + 4z + 20 = 0$$

$$\Delta' = 2^2 - 13 = -9 = (3i)^2, \quad \underline{z^2 - 4z + 13 = 0}$$

$$\text{ومنه : } z_1 = 2 - 3i, \quad z_2 = 2 + 3i$$

$$\Delta' = 2^2 - 20 = -16 = 16i^2, \quad \underline{z^2 + 4z + 20 = 0}$$

$$\text{ومنه : } z_3 = -2 - 4i, \quad z_4 = -2 + 4i$$



3- أنشئ في معلم متعامد ومتجانس النقاط:

$N, H, C, K$  ذات اللواحق على الترتيب :

$$-2 + 4i, -2 - 4i, 2 + 3i, 2 - 3i$$

(ب) عين العدد المركب  $z$  الذي يحقق  $\frac{z - z_C}{z - z_N} = i$  ، ثم أنشئ

النقطة  $M$  صورة  $z$  .

$$4- (أ) \text{ فسر هندسيا } \left| \frac{z - z_C}{z - z_N} \right| \text{ و عمدة } \left( \frac{z - z_C}{z - z_N} \right)$$

(ب) ما طبيعة المثلث  $NCM$  ؟ (ج) عين لاحقة  $D$  رابع رأس المربع  $NMCD$  .

الحل

(1) تعيين العدد بين الحقيقيين  $A$  و  $B$  .

$$P(z) = (z^2 + Az + B)(z^2 + 4z + 20)$$

$$= z^4 + (4 + A)z^3 + (20 + 4A + B)z^2 +$$

$$(20A + 4B)z + 20B = z^4 + 17z^2 - 28z + 260$$

$$\text{بالمطابقة نجد : } \begin{cases} 4 + A = 0 \\ 20 + 4A + B = 17 \\ 20A + 4B = -28 \\ 20B = 260 \end{cases} \text{ ومنه :}$$

$$B = 13, A = -4$$

(2) حل للمعادلة  $P(z) = 0$  .



$$\frac{z - z_C}{z - z_N} = i \text{ تحقق}$$

$$\frac{z - z_C}{z - z_N} = i \text{ ومنه : } i(z - z_N) = z - z_C \text{ ومنه :}$$

$$z(1 - i) = z_C - iz \text{ ومنه : } z = \frac{z_C - iz_N}{1 - i}$$

$$z = \frac{2 + 3i - i(-2 + 4i)}{1 - i} = \frac{6 + 5i}{1 - i} = \frac{1}{2} + \frac{11}{2}i \text{ إذن}$$

$$\text{ومنه } M\left(\frac{1}{2}; \frac{11}{2}\right)$$

$$(4) \text{ التفسير الهندسي للنتيجة } \left| \frac{z - z_C}{z - z_N} \right| \text{ وعمدة } \left( \frac{z - z_C}{z - z_N} \right)$$

$$\left| \frac{z - z_C}{z - z_N} \right| = \frac{|z - z_C|}{|z - z_N|} = \frac{MC}{MN}$$

$$\arg\left(\frac{z - z_C}{z - z_N}\right) = \arg(z - z_C) - \arg(z - z_N)$$

$$= (\vec{i}, \overrightarrow{MC}) - (\vec{i}, \overrightarrow{MN}) = (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MC})$$

$$\frac{MC}{MN} \text{ تمثل } \left| \frac{z - z_C}{z - z_N} \right|$$

$$\text{عمدة } \left( \frac{z - z_C}{z - z_N} \right) \text{ تمثل الزاوية } (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MC})$$

(ب) طبيعة المثلث  $NCM$ .

$$\frac{MC}{MN} = \left| \frac{z - z_C}{z - z_N} \right| = |i| = 1 \text{ ومنه : } MN = MC$$

$$\text{الزاوية } (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MC}) \text{ هي عمدة } \left( \frac{z - z_C}{z - z_N} \right)$$

$$\arg\left(\frac{z - z_C}{z - z_N}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$$

إذن المثلث  $NCM$  قائم الزاوية في  $M$  ومتساوي الساقين.

(ج) تعيين لاحقة  $D$  الرأس الرابع للمربع  $NMCD$ .

$$NMCD \text{ مربع معناه } \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{CD} \text{ يكافئ } Z_{\overrightarrow{MN}} = Z_{\overrightarrow{CD}}$$

$$\text{ومنه : } (-2 + 4i) - \left(\frac{1}{2} + \frac{11}{2}i\right) = z_D - 2 - 3i$$

$$z_D - 2 - 3i = \frac{-5}{2} - \frac{3}{2}i \text{ ومنه : } z_D = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\text{إذن لاحقة } D \text{ هي } z_D = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$



## تمارين مرفقة بالنتائج

### تمرين 01

$$\alpha = -\sqrt{3} + i$$

(1) أكتب  $\alpha$  على الشكل المثلثي. (2) أ - أكتب  $z$  على الشكلين المثلثي

و الجبري حيث :  $\alpha \cdot z = 2\sqrt{2} \left( \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$  .

ب - استنتج قيمة  $\cos \frac{7\pi}{12}$  و  $\sin \frac{7\pi}{12}$  .

(3) المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  ،

$A$  و  $B$  نقطتان من المستوي لاحقتاهما على الترتيب

$-\sqrt{3} + i$  و  $1 - i$  . عين لاحقة  $C$  حتى تكون النقطة  $O$  مركز ثقل المثلث  $ABC$  .


- النتائج: (1)  $\alpha = 2 \left( \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$

(2) أ -  $z = \boxed{1 - i}$  . ب -  $\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$  ،

$\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{-\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$  . (3)  $z_C = \sqrt{3} - 1$

### تمرين 02

نعتبر الدوران  $R$  المعروف في المجموعة  $C$  بـ :  $z' = \alpha z + \beta$



Scanned by : Mekkaoui Ayoub  
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr



حيث:  $|\beta| = 1$  نضع  $L = \frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha\beta}$ .

(1) عين  $\bar{L}$  ثم استنتج أن  $L$  حقيقيا.

(2) عين  $\alpha$  و  $\beta$  علما أن صورتا النقطتين  $A\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  هما  $A'\left(0; \frac{1}{2}\right)$ ،  $B'(0; 1)$  على الترتيب، ثم

عين العناصر المميزة للدوران  $R$ .

- النتائج: (1)  $\bar{L} = \frac{\bar{\alpha} + \bar{\beta}}{1 + \alpha\beta}$  بما أن  $L = \bar{L}$  فإن  $L$  حقيقيا.

(2)  $\alpha = i$  و  $\beta = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ، العناصر المميزة للدوران  $R$  هي:

الزاوية  $\frac{\pi}{2}$  والمركز النقطة ذات اللاحقة

$$\frac{1}{4}[(\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1)]$$

### تمرين 03

(1) احسب  $(1+4i)^2$ . (2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة:

$$z^2 - (3+2i)z + 5+i = 0$$

نسمي  $z_1$  و  $z_2$  حلي المعادلة حيث:

(3) أ- اكتب  $z_1$  على الشكل المثلثي.  $|z_2| > |z_1|$

ب- احسب  $\left(\frac{z_1}{\sqrt{2}}\right)^{2002}$ .

(4) في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، نعتبر النقاط  $A, B, C, D$  ذات اللواحق على الترتيب

$z_1, z_2, (1+i), (3-i)$ . أ- برهن على وجود تشابه

$S$  مركزه  $C$  ويحول النقطة  $A$  إلى النقطة  $D$ .

- النتائج:

(1)  $(1+4i)^2 = -15+8i$  (2)  $z_1 = 1-i, z_2 = 2+3i$ .

(3) أ-  $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right)\right)$

ب-  $\left(\frac{z_1}{\sqrt{2}}\right)^{2002} = -i$

(4) أ- العبارة المركبة للتشابه  $S$  هي:  $z' = (1+i)z + 1-i$ .

ب- العناصر المميزة للتشابه هي: النسبة  $\sqrt{2}$ ، الزاوية  $\frac{\pi}{4}$ ،

المركز هو النقطة  $C$  ذات اللاحقة  $(1+i)$ .

### تمرين 04

(1) أكتب على الشكل المثلثي جذور المعادلة

\*  $z^3 = 4\sqrt{2}(-1+i)$ . - تحقق أن  $z_0 = \sqrt{2}(1+i)$  هو

حل للمعادلة \* (2) أكتب الجذور التكعيبية على الشكل الجبري

للعدد 1، ثم استنتج الشكل الجبري لحلول المعادلة \*.



$$(3) \text{ استنتج قيمة } \cos \frac{11\pi}{12} , \sin \frac{11\pi}{12}$$

- النتائج:

(1) حلول المعادلة \* هي :

$$z_0 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$z_1 = 2 \left( \cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

$$z_2 = 2 \left( \cos \frac{19\pi}{12} + i \sin \frac{19\pi}{12} \right)$$

(2) الجذور التكعيبية للعدد 1 هي:  $1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$  وتكون جذور المعادلة \* على الشكل الجبري هي:

$$z_0 = \sqrt{2}(1+i), z_1 = -\frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{2} + \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{2}i$$

$$z_2 = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{2} - \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{2}i$$

$$\cos \frac{11\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} + (1+\sqrt{3})}{4} \quad (3)$$

$$\sin \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4}$$

### تمرين 05

نعتبر كثير الحدود :

$$P(z) = z^4 - 8(1+i)z^3 + 48iz^2 + 64(1-i)z - 80$$

(1) أ- برهن أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$  وجذرا تخيليا  $z_1$  يطلب تعيينهما.

ب- عين العددين الحقيقيين  $\alpha$  و  $\beta$  بحيث:

$$P(z) = (z - z_0)(z - z_1)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

(2) حل المعادلة  $P(z) = 0$  في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس نعتبر النقاط :

$$A(2;0), B(0;2), C(2;4)$$

$$D(4;2) \text{ هو الدوران الذي مركزه } A \text{ و زاويته } \frac{\pi}{2}$$

- تحقق أن  $R(D) = B$  (3) - عين لاحقة  $C'$  صورة النقطة  $C$  بالدوران  $R$ .

- النتائج:

$$(1) \text{ أ- } z_0 = 2, z_1 = 2i \text{ ب- } \alpha = -(6+6i), \beta = 20i$$

$$(2) \text{ حلول المعادلة هي : } z_0 = 2, z_1 = 2i$$

$$(3) z_4 = 4+2i, z_3 = 2+4i, z_{C'} = -2$$

### تمرين 06

$\alpha$  عدد مركب طويلته  $r$  و عمدته  $\theta$  حيث  $\theta \in ]0; \pi[$ .



(1) أنشر  $\left[1+i(1-\alpha^2)\right]^2$  (2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  
 الجذر المستقل عن  $\alpha$  و  $z_2$  للجذر الآخر.  
 $z^2 - [1+i(\alpha^2+1)]z + \alpha^2(-1+i) = 0$  ، نرمز بـ  $z_1$  إلى

(3) أ- عين العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون  $z^n$  حقيقي موجب .

ب- حدد  $r$  و  $\theta$  حتى يكون  $z_1$  و  $z_2$  مترافقان.

- النتائج:

$$(1) \quad -\alpha^4 + 2\alpha^2 + 2i(1-\alpha^2) \quad (2) \quad z_1 = 1+i, z_2 = \alpha^2 i$$

$$(3) \quad \text{أ-} \quad n = 8K \quad (K \in \mathbb{N}) \quad \text{ب-} \quad r = \sqrt[4]{2}, \theta = \frac{5\pi}{8}$$

تمرين 07

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة ذات المجهول  $z$  .

$$z^3 - 2(1+i\sqrt{3})z^2 + 4(-1+i\sqrt{3})z + 8 = 0 \quad \dots *$$

(1) بين أن المعادلة \* تقبل حلا حقيقيا  $z_0$  يطلب تعيينه .

(2) حل المعادلة \* ، يرمز لحلول المعادلة \* بـ  $z_0, z_1, z_2$  حيث

$z_1$  هو الحل الذي جزؤه الحقيقي سالب . (3) أ- أكتب حلول

المعادلة \* على الشكل المثلثي . ب- احسب  $z_1^2, z_1^3$  .

ج- أثبت أنه :  $\forall n \in \mathbb{N}$  فإن  $z_1^{3n+2} = -2^{3n+1} \cdot z_2$  .

د- عين قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يكون  $z_2^n$  عدد حقيقي .

- النتائج:

$$(1) \quad z_0 = 2 \quad (2) \quad z_0 = 2, z_1 = -1+i\sqrt{3}, z_2 = 1+i\sqrt{3}$$

$$(3) \quad \text{أ-} \quad z_0 = 2(\cos 0 + i \sin 0)$$

$$z_2 = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right), z_1 = 2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\text{ب-} \quad z_1^3 = 8, z_1^2 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$\text{ج-} \quad z_1^{3n+2} = z_1^{3n} \times z_1^2 = -2^{3n+1} \cdot z_2$$

$$\text{د-} \quad n = 3K, (K \in \mathbb{N})$$

تمرين 08

$$f(z) = \frac{3iz + 1 - 3i}{z - 2} \quad \text{ب-} \quad \mathbb{C} - \{2\}$$

(1) أ- برهن بأن  $f$  هو تقابل من  $\mathbb{C} - \{2\}$  على مجموعة جزئية

من  $\mathbb{C}$  يطلب تعيينها . ب- أكتب عبارة  $f^{-1}$  .

(2) نعتبر التحويل  $T$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة

$$M'(z') \quad \text{حيث} \quad z' = f(z)$$

(3) عين مجموعة النقاط الصامدة للتحويل  $T$  .

(4) عين مجموعة النقاط  $M(z)$  بحيث  $|f(z)| = 1$  .

- النتائج:

$$(1) \quad \text{أ-} \quad f \text{ هو تقابل من } \mathbb{C} - \{2\} \text{ نحو } \mathbb{C} - \{3i\}$$

$$\text{ب-} \quad f^{-1}(z) = \frac{2z + 1 - 3i}{z - 3i}$$

(2) التحويل  $T$  له نقطتان صامدتان لاحقتاهما:

$$z_2 = 1+i, z_1 = 1+2i$$



(3) مجموعة النقاط  $M(z)$  هي الدائرة التي مركزها  $\omega\left(\frac{7}{8}; \frac{3}{8}\right)$

$$\text{ونصف قطرها } r = \frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{2}}$$

تمرين 09

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^2 - 4(1+i)z + 16i = 0$ .

(2) استنتج حلول المعادلة (\*)  $z^4 - 4(1+i)z^2 + 16i = 0$ .

(3) في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس، نعتبر النقط  $M_1, M_2, M_3, M_4$  صور حلول المعادلة (\*). بين أن هذه النقط تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(4) نعتبر التحويل  $S$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة

$$M'(z') \text{ حيث : } z' = \sqrt{2}(1+i)z + 1 - \sqrt{2}(1+i)$$

ما طبيعة التحويل  $S$  وما هي عناصره المميزة؟

- النتائج:

(1) حلول المعادلة هي:  $z_1 = 4, z_2 = 4i$ .

(2) حلول المعادلة (\*) هي:  $z_1 = 2, z_2 = -2$ .

$$z_3 = \sqrt{2}(1+i), z_4 = -\sqrt{2}(1+i)$$

(3) لدينا  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4| = 2$  أي :

$OM_1 = OM_2 = OM_3 = OM_4 = 2$  إذن النقط  $M_1, M_2, M_3, M_4$

تنتمي إلى نفس الدائرة مركزها  $O$  (مبدأ المعلم) ونصف قطرها 2.

(4) التحويل  $S$  هو تشابه نسبته 2 و زاويته  $\frac{\pi}{4}$  و مركزه النقطة

الصامدة ذات اللاحقة 1.

تمرين 10

$$\text{ليكن العدان المركبان } z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i), z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

(1) أكتب على الشكل المثلثي  $z_1, z_2, \frac{z_1}{z_2}$ ،  $(z_1 \cdot z_2)^6$  :

(2) في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس نعتبر الدوران

$R$  الذي مركزه  $\omega(1;0)$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ . أ- أكتب العبارة المركبة

للدوران  $R$ . ب- لتكن النقطتان  $A$  و  $B$  ذات اللاحقتين على

الترتيب  $z_1$  و  $z_2$ . عين لاحقتي  $R(A)$  و  $R(B)$ .

- النتائج:

$$z_1 = \cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right), z_2 = \cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3} \quad (1)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \cos\left(\frac{-7\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{-7\pi}{12}\right),$$

$$(z_1 \cdot z_2)^6 = \cos\frac{\pi}{2} + i \sin\frac{\pi}{2}$$

$$(2) \text{ أ- } z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)z + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$



لاحقة النقطة  $R(A)$  هي :  $\left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}i$

ب- لاحقة  $R(B)$  :

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

### تمرين 11

لتكن في  $\mathbb{C}$  المعادلة :

$$(1) \quad z^3 + (8 - 2i)z^2 + (20 - 10i)z + 12 - 16i = 0$$

(1) تحقق أن  $z_0 = -1 + i$  هو حل للمعادلة (1).

(2) استنتج الجذرين الآخرين  $z_1$  و  $z_2$  للمعادلة (1) (الجزء التخييلي لـ  $z_1$  موجب).

(3) في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس نعتبر النقط  $A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_0, z_1$  و  $z_2$ .

أ- عين لاحقة  $G$  مرجع الجملة :  $\{(A; 2), (B; -2), (C; 1)\}$ .

ب- عين المجموعة  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M(z)$  حيث

$$2MA^2 - 2MB^2 + MC^2 = 56$$

- النتائج :

(1)  $z_0$  يحقق المعادلة (1). (2) الجذرين الآخرين للمعادلة (1) هما :

$$z_1 = -4 + 2i \quad \text{و} \quad z_2 = -3 - i$$

(3) أ-  $z_G = 3 - 3i$  . ب- المجموعة  $(\Gamma)$  هي الدائرة التي

مركزها  $G$  و نصف قطرها 10 .

### تمرين 12

ليكن  $L = \frac{\alpha i - 4\beta}{5 + 3i}$  حيث  $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$  عين العددين

الحقيقيين  $\alpha$  و  $\beta$  علما أن  $|L| = 1$  و  $\text{Arg} L \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$  .

(2) نفرض أن  $\alpha = \sqrt{2}$  و  $\beta = \sqrt{2}$  . أ- احسب  $L^{12} + L^{16}$  .

ب- برهن أنه مهما تكون الأعداد الطبيعية  $n$  ( عدد زوجي )

و  $m$  ( عدد فردي ) فإن :  $L^{4n} + L^{4m} = 0$  .

- النتائج :

$$(1) \quad \alpha = \beta = \sqrt{2} \quad . \quad 2 - 1 \text{ لدينا } L^4 = -1$$

$$L^{12} + L^{16} = (L^4)^3 + (L^4)^4 = -1 + 1 = 0$$

$$(ب) \quad L^{4n} = (L^4)^n = 1 \quad \text{و} \quad L^{4m} = (L^4)^m = -1$$

$$\text{ومنه: } L^{4n} + L^{4m} = 0$$

### تمرين 13

نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  كثير الحدود :

$$P(z) = z^3 + z^2 + (-5 + 4i)z - 21 - 12i$$

(1) أ- برهن بأن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل حلا حقيقيا  $z_0$  يطلب

تعيينه . ب- حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $P(z) = 0$  .

(2) في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس نعتبر النقط

$A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب :  $3, -1 - 2i, -3 + 2i$  .

عين التشابه  $S$  الذي مركزه  $A$  و يحول  $B$

إلى  $C$  ثم أعط عناصره المميزة .



- النتائج:

1) أ-  $z_0 = 3$  . ب- حلول المعادلة  $P(z) = 0$  هي :  $z_0 = 3$  ،

$z'_1 = (1-i)z + 3i$  (2 .  $z_2 = -3 + 2i$  ،  $z_1 = -1 - 2i$

العناصر المميزة للتشابه  $S$  هي : المركز : النقطة  $A$  ،

النسبة :  $|1-i| = \sqrt{2}$  ، الزاوية :  $-\frac{\pi}{4}$  .

تمرين 14

1) أكتب العدد المركب  $u = \frac{\sqrt{3}-i}{1-i}$  على شكله الجبري

و المثلثي . 2) احسب  $u^4$  .

3) عين الجذور من الرتبة الرابعة للعدد  $L = 2(1+i\sqrt{3})$  .

- النتائج:

$$u = \frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i \quad (1)$$

$$u = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

2)  $u^4 = 2(1+i\sqrt{3})$  . الجذور من الرتبة الرابعة للعدد  $L$  هي:

$$\frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i , \quad -\frac{\sqrt{3}+1}{2} - \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$$

$$\frac{\sqrt{3}-1}{2} - \frac{\sqrt{3}+1}{2}i , \quad -\frac{\sqrt{3}-1}{2} + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i$$

تمرين 15

نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  كثير الحدود :

$$P(z) = z^3 - 2z^2 - iz + 3 - i$$

1) أ- احسب  $P(-1)$  . ب- أوجد كثير الحدود  $Q(z)$  بحيث:

ج- حل في المجموعة  $\mathbb{C}$  المعادلة  $P(z) = (z+1) \times Q(z)$

2)  $P(z) = 0$  ليكن  $z_1$  الحل الذي جزؤه التخيلي موجب

و  $z_2$  الحل الذي جزؤه التخيلي سالب و  $z_3$  الحل الثالث.

أ- أكتب كل من الأعداد :  $z_1 - 1$  ،  $z_2$  ،  $z_3$  على الشكل المثلثي .

ب- تحقق أن  $(z_1 - 1)z_2$  هو عدد حقيقي وأن  $\frac{z_1 - 1}{z_2}$  هو عدد

تخيليا صرفا . 3) لتكن  $M_1$  و  $M_2$  صورتين العددين  $z_1 - 1$

و  $z_2$  على التوالي في المستوي المركب .

أ- بين أن المثلث  $OM_1M_2$  متساوي الساقين (  $O$  مبدأ المعلم )

ب- احسب قياس زاوية الدوران الذي مركزه النقطة  $O$  و يحول

$M_1$  إلى  $M_2$  .

- النتائج:

1) أ-  $P(-1) = 0$  . ب-  $Q(z) = z^2 - 3z + 3 - i$  .

ج- حلول المعادلة  $P(z) = 0$  هي :  $2+i$  ،  $1-i$  ،  $-1$  .

2) أ-  $z_1 - 1 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$  ،



$$z_2 = \sqrt{2} \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$z_3 = \cos \pi + i \sin \pi$$

$$\text{ب- } (z_1 - 1)z_2 = 2 \quad , \quad \frac{z_1 - 1}{z_2} = i$$

$$(3) \text{ أ- } OM_1 = |z_1 - 1| = \sqrt{2} \quad , \quad OM_2 = \sqrt{2} \text{ فالمثلث } OM_1M_2 \text{ متساوي الساقين .}$$

ب- زاوية الدوران الذي مركزه النقطة  $O$  و يحول  $M_2$  إلى  $M_1$  هي  $\frac{\pi}{2}$ .

### تمرين 16

نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^2 - 2i\bar{z} = 0$  ..... (E) نضع  $z = x + iy$  حيث  $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ .

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (E). (2) ليكن  $z_1, z_2, z_3$  حلول المعادلة (E) غير المعدومة. (أ) - أنشئ في المستوي المركب النقط  $M_1(z_1)$  و  $M_2(z_2)$  و  $M_3(z_3)$  و أثبت أن المثلث  $M_1M_2M_3$  متقايس الأضلاع.

(3) ليكن  $f$  تطبيق بحيث:  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$f(z) = (-\sqrt{3} + i)z + i \quad \text{و}$$

أ- حدد طبيعة و عناصر التطبيق  $f$ . ب- لتكن  $z'_1, z'_2, z'_3$  صور  $z_1, z_2, z_3$  على التوالي ب  $f$ . بين أن النقط  $M'_1(z'_1)$  و  $M'_2(z'_2)$  و  $M'_3(z'_3)$  تنتمي إلى دائرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها.

- النتائج:

(1) حلول المعادلة (E) هي:  $0, -2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i$ .

(2) ب-  $M_2M_3 = M_1M_3 = M_1M_2 = 2\sqrt{3}$  فالمثلث  $M_1M_2M_3$  متقايس الأضلاع.

(3) التطبيق  $f$  هو تشابه مباشر مركزه النقطة  $\omega$  لاحقها

$$\frac{i}{1 + \sqrt{3} - i} \quad \text{و نسبته } 2 \quad \text{و زاويته } \frac{5\pi}{6}.$$

### تمرين 17

نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  كثير الحدود:

$$P(z) = z^4 - 2z^3 + 6z^2 - 8z + 8$$

(1) تحقق أن  $z_0 = 2i$  هو حل للمعادلة (E):  $P(z) = 0$ .

(2) أ- بين أنه إذا كان  $z$  حل للمعادلة (E) فإن  $\bar{z}$  يكون حلا أيضا

للمعادلة (E). ب- استنتج حل آخر للمعادلة (E).

(3) عين عددين مركبين  $a$  و  $b$  بحيث:

$$P(z) = (z^2 + 4)(z^2 + az + b)$$

(4) حل المعادلة (E) و أكتب الحلول على الشكل المثلثي.



(5) في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  نعتبر النقط  $A(z_0)$  و  $B(z_1)$  و  $C(z_1 - 2)$  مع  $z_0 = 2i$  و  $z_1 = 1 + i$ . ليكن  $R$  الدوران بحيث  $R(O) = C$  و  $R(A) = B$ . حدد عناصر الدوران  $R$ .

- النتائج:

(1) نجد :  $P(2i) = 0$  . أ-  $z$  حل للمعادلة  $(E)$  يعني

$P(z) = 0$  ومنه :  $\overline{P(z)} = 0$  أي أن :

$$P(\bar{z}) = 0 \quad \text{ومنه} \quad \bar{z}^4 - 2\bar{z}^3 + 6\bar{z}^2 - 8\bar{z} + 8 = 0$$

إذن  $\bar{z}$  حل للمعادلة  $(E)$ .

ب- بما أن  $z = 2i$  حل للمعادلة  $(E)$  فإن  $\bar{z} = -2i$  حل لـ  $(E)$

(3)  $a = -2$  و  $b = 2$  . (4) حلول المعادلة  $P(z) = 0$  هي :

$2i$  ،  $-2i$  ،  $1-i$  ،  $1+i$   
الكتابة على الشكل المثلثي :

$$1+i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$1-i = \sqrt{2} \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$-2i = 2 \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right]$$

$$2i = 2 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

(5) عبارة الدوران  $R$  هي :  $z' = -iz - 1 + i$ . مركز الدوران  $R$  هو النقطة التي لاحقتها  $i$  وزاوية الدوران  $R$  هي  $\frac{3\pi}{2}$ .

### تمرين 18

أكتب على الشكل المثلثي كلا من العددين المركبين

$$b = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \quad , \quad a = \frac{1}{2}(1+i)$$

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E)$  :  $z^2 + (-1+2i)z - i = 0$

(3) ليكن  $z_1$  ،  $z_2$  جذري المعادلة  $(E)$  بحيث تخيلي  $z_1$  أصغر من

$$z_2 \quad \text{تخيلي} \quad z_2 \quad \text{أ-} \quad \text{بين أن} \quad a \cdot z_1 = \left( \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) b$$

ب - استنتج كتابة  $z_1$  على الشكل المثلثي .

ج - أكتب  $z_1 \cdot z_2$  على الشكل المثلثي ثم استنتج كتابة  $z_2$  على المثلثي . (4) ليكن في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد

ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  التشابه  $S$  الذي يربط كل نقطة  $M(z)$

$$\text{بالنقطة} \quad M'(z') \quad , \quad \text{حيث} \quad z' = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \right) z$$

حدد عناصر التشابه  $S$ .



- النتائج:

$$a = \frac{\sqrt{2}}{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad (1)$$

$$b = \cos \left( -\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{6} \right)$$

$$z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}-2}{2}i, \quad z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}+2}{2}i \quad (2)$$

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} \left[ \cos \left( -\frac{5\pi}{12} \right) + i \sin \left( -\frac{5\pi}{12} \right) \right] \quad (3) \text{ ب-}$$

$$z_1 \cdot z_2 = \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{2} \right) \rightarrow$$

$$z_2 = \frac{2}{\sqrt{2}+\sqrt{6}} \left[ \cos \left( \frac{-\pi}{12} \right) + i \sin \left( \frac{-\pi}{12} \right) \right]$$

(4) عناصر التشابه: مركز التشابه S هو مبدأ المعلم O ، نسبة

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ هي زاويته هي } \frac{\pi}{4}.$$

تمرين 19

(1) احسب طويلة و عمدة العدد المركب  $\alpha = 6 - 6i\sqrt{3}$

واستنتج الجذرين التربيعيين للعدد  $\alpha$ .

(2) حل في C المعادلة:

$$2z^2 - (5 + i\sqrt{3})z + 2(1 + i\sqrt{3}) = 0$$

الحقيقي بـ b و الجذر الآخر بـ a . (3) نعتبر التحويل T الذي

يحول النقطة M ذات اللاحقة z إلى النقطة M' بحيث

$$z' = az + b \quad (a \text{ و } b \text{ هما العددان من السؤال 2})$$

(3) حدد طبيعة و عناصر التحويل T.

- النتائج:

$$\alpha = 12 \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right] \quad (1) \text{ الجذرين التربيعيين}$$

للعدد  $\alpha$  هما:  $-3 + i\sqrt{3}$  ،  $3 - i\sqrt{3}$ .

$$b = 2, \quad a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$z' = \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) z + 2 \quad (3) \text{ التحويل T هو دوران لأن:}$$

$$\left| \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = 1, \text{ زاويته } \frac{\pi}{3} \text{ ومركزه النقطة ذات اللاحقة}$$

$$1 + i\sqrt{3}$$

تمرين 20

في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد و متجانس ، نعتبر النقط

$$A, B, C \text{ التي لواحقها على الترتيب } z_A = 3(1 + i\sqrt{3}),$$

$$z_C = \frac{3}{2}(1 + i\sqrt{3}), \quad z_B = \frac{1}{2}(9 + 5i\sqrt{3})$$

(1) عين لاحقة G مرجع الجملة:

$$\{(A; -1), (B; +1), (C; +1)\}$$



(2) عين لواحق النقط  $A'$  ،  $B'$  ،  $C'$  صور النقط  $A$  ،  $B$  ،  $C$  على الترتيب بالدوران الذي مركزه  $G$  وزاويته  $\frac{2\pi}{3}$ .

(3) بين أن المثلث  $ABC$  قائم .  
- النتائج:

$$(1) \quad z_G = 3 + i\sqrt{3} \quad \text{الدوران معرف بـ}$$

$$z_{C'} = 3, \quad z_{B'} = i\sqrt{3}, \quad z_{A'} = 0, \quad z' = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z + 6$$

$$(3) \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \quad \text{فالمثلث } ABC \text{ قائم في } A.$$

تمرين 21

$$L \text{ عدد مركب حيث : } L = \frac{z+2i}{z-i} \quad (1) \quad \text{أكتب على الشكل}$$

(2)  $L = \alpha + i\beta$  عين مجموعة النقط  $M(x; y)$  ذات اللاحقة  $z$  التي من أجلها : أ - يكون  $L$  حقيقيا سالبا تماما .

ب - تكون عمدة  $L$  تساوي  $\frac{\pi}{2}$  . ج -  $|L| = 1$  .

- النتائج:

$$(1) \quad L = \frac{x^2 + y^2 + y - 2}{x^2 + (y-1)^2} + \frac{3x}{x^2 + (y-1)^2}i$$

(2) أ - مجموعة النقط  $M$  المطلوبة هي القطعة المستقيمة  $[AB]$  حيث  $A(0;1)$  و  $B(0;-2)$  باستثناء  $A$  و  $B$  .

ب - مجموعة النقط  $M$  هي القوس  $\widehat{AB}$  حيث  $A(0;1)$  و  $B(0;-2)$  و تقع في الربع الأول و الرابع . ج - مجموعة النقط  $M$  المطلوبة هي المستقيم ذو المعادلة :  $y = -\frac{1}{2}$  .

تمرين 22

$$(1) \quad \text{عين العدد الحقيقي } x \text{ بحيث } (x-i)^2 = 3-4i$$

$$(2) \quad \text{حل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة : } iz^2 - 3iz + 1 + 3i$$

- النتائج:

$$(1) \quad x = 2 \quad (2) \quad \text{حلا المعادلة هما : } z_1 = 1-i \text{ و } z_2 = 2+i$$

تمرين 23

لتكن في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E)$  :

$$z^3 - (3+i)z^2 + (6+2i)z - 4(1+i) = 0$$

$$(1) \quad \text{عين العدد الحقيقي } a \text{ حتى يكون } z_1 = a(1+i) \text{ حل للمعادلة .}$$

$$(2) \quad \text{حل المعادلة } (E) .$$

$$(3) \quad \text{أكتب الجذور الثلاثة للمعادلة } (E) \text{ على الشكل المثلثي .}$$

- النتائج:

$$(1) \quad a = 1 \quad (2) \quad \text{حلول المعادلة } (E) \text{ هي :}$$

$$z_1 = 1+i, \quad z_2 = 1-i\sqrt{3}, \quad z_3 = 1+i\sqrt{3}$$



### تمرين 25

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \frac{z + \bar{z} - i}{z - i \times \bar{z}} \quad \text{نعتبر الدالة :}$$

(1) عين مجموعة تعريف الدالة  $f$ .

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $f(z) = i$  (3) عين مجموعة النقط

$M(x; y)$  التي لاحقتها  $z$  حتى يكون  $f(z)$  تخيليا صرفا.

- النتائج:

(1)  $f$  معرفة إذا كان  $z = x + iy$  و  $x \neq y$ .

(2) حلول المعادلة  $f(z) = i$  هي:  $z = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ .

(3) مجموعة النقط  $M$  المطلوبة هو المستقيم  $(D)$  ذو المعادلة

$$x = -\frac{1}{2} \text{ باستثناء النقطة } \left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right).$$

### تمرين 26

(1) احسب طولية وعمدة العدد المركب  $\alpha = \frac{1+i}{i\sqrt{3}+1}$ .

(2) استنتج جذور المعادلة  $z^3 = \alpha$ .

(3) عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $\alpha^n \in \mathbb{R}$ .

$$z_1 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad (3)$$

$$z_2 = 2 \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right]$$

$$z_3 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

### تمرين 24

ليكن العددان المركبان  $z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$  و  $z_2 = 1 - i$ .

(1) أكتب  $z_1$  و  $z_2$  على الشكل المثلثي. (2) استنتج طولية وعمدة

العدد المركب  $z = \frac{z_1}{z_2}$ . (3) احسب  $\cos \frac{\pi}{12}$  و  $\sin \frac{\pi}{12}$ .

- النتائج:

$$z_1 = \sqrt{2} \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{6} \right) \right] \quad (1)$$

$$z_2 = \sqrt{2} \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right] \quad \text{و}$$

$$\arg z \equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \quad , \quad |z| = 1 \quad (2)$$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad \text{و} \quad \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (3)$$



- النتائج:

$$|\alpha| = \frac{|1+i|}{|i\sqrt{3}+1|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1)$$

$$\arg(\alpha) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}[2\pi] = -\frac{\pi}{12}[2\pi]$$

(2) جذور المعادلة  $z^3 = \alpha$ .

$$z_0 = \frac{1}{\sqrt[6]{2}} \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{36}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{36}\right) \right]$$

$$z_1 = \frac{1}{\sqrt[6]{2}} \left( \cos \frac{23\pi}{36} + i \sin \frac{23\pi}{36} \right)$$

$$z_2 = \frac{1}{\sqrt[6]{2}} \left( \cos \frac{47\pi}{36} + i \sin \frac{47\pi}{36} \right)$$

(3)  $n$  من مضاعفات 12.

تمرين 27

عين ثلاثة أعداد مركبة  $A, B, C$  علما أن:

$A, B, C$  حدود متتابعة من متتالية حسابية

و  $A+B+C=3i$  و  $A \times B \times C = 2-i$ .

- النتائج:

$$A=1+2i \quad \text{و} \quad B=i \quad \text{و} \quad C=-1$$

$$\text{أو} \quad A=-1 \quad \text{و} \quad B=i \quad \text{و} \quad C=1+2i.$$

تمرين 28

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^4 = 1$ .

(2) استنتج في  $\mathbb{C}$  حلول المعادلة:  $[(\sqrt{3}-i)z+i]^4 = 1$

(3) نعتبر التحويل  $T$  الذي يرفق بكل نقطة  $M$  ذات اللاحقة

$z$  النقطة  $M'$  ذات اللاحقة  $z'$  حيث  $z' = (\sqrt{3}-i)z+i$ .

ما طبيعة التحويل  $T$  وما هي عناصره المميزة؟

- النتائج:

$$(1) \quad z_0 = 1, \quad z_1 = -1, \quad z_2 = i, \quad z_3 = -i.$$

(2) حلول المعادلة هي:

$$0, \quad \frac{-\sqrt{3}+1}{4} - \frac{\sqrt{3}+1}{4}i, \quad \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{-\sqrt{3}+1}{4}i, \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

(3) التحويل  $T$  هو تشابه نسبته 2 وزاويته هي:

$$\arg(\sqrt{3}-i) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{i}{1-(\sqrt{3}-i)}$$

تمرين 29

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة:  $z^2 - 2i = 0$ .



(3) عين قيم العدد  $n$  حتى يكون  $z^n \in \mathbb{R}$ .  
- النتائج:

$$\arg z_1 \equiv \frac{2\pi}{3}[2\pi] \quad , \quad |z_1| = 1 \quad (1)$$


$$\arg z_2 \equiv -\frac{\pi}{4}[2\pi] \quad , \quad |z_2| = 1$$

$$z = \cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \quad (2)$$

$$z = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} + i \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

$$\sin \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad , \quad \cos \frac{11\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

(3)  $n$  من مضاعفات 12.



(2) نعتبر المتتالية الهندسية المعرفة بـ :  $V_2 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$

و  $V_4 = -\sqrt{3} + i$ . - عين أساس هذه المتتالية.

(3) نعتبر المتتالية الهندسية التي أساسها جزؤه الحقيقي موجب .  
أحسب  $V_{19}$  وعين طويلته وعمدته.

- النتائج:

$$(1) \quad z = -1 - i \quad \text{أو} \quad z = 1 + i$$

$$(2) \quad q = -1 - i \quad \text{أو} \quad q = 1 + i$$

$$V_{19} = V_0 \times q^{19} = \frac{1}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) \times (1+i)^{19} \quad (3)$$

$$\text{ومنه : } |V_{19}| = 2^8 \sqrt{2} \quad , \quad \arg(V_{19}) \equiv \frac{7\pi}{12}[2\pi]$$

تمرين 30

$$z_1 \text{ و } z_2 \text{ عدنان مركبان حيث : } z_1 = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^4$$

$$(1) \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{احسب طويلة وعمدة كل من } z_1 \text{ و } z_2.$$

(2) عين الشكل الجبري و المثلثي للعدد المركب  $z = \frac{z_1}{z_2}$  ثم استنتج

$$\text{قيمة } \cos \frac{11\pi}{12} \text{ و } \sin \frac{11\pi}{12}.$$



## تمارين مقترحة للحل

### تمرين 01

نعتبر العدد المركب  $\alpha = \frac{z+4i}{z-4i}$  حيث  $z = x + iy$

(1) أكتب  $\alpha$  على الشكل الجبري (2) أ - عين  $E_1$  مجموعة النقط

$M(z)$  حيث  $Arg\alpha \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$  ب - عين  $E_2$  مجموعة

النقط  $M(z)$  التي من أجلها يكون  $\alpha$  حقيقيا سالبا

### تمرين 02

لتكن في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة (I) ذات المجهول  $z$

$$(I) \quad z^2 - (\sqrt{3} + 1 + 2i)z + (\sqrt{3} - 1) + i(\sqrt{3} + 1) = 0$$

(1) أ - احسب  $(\sqrt{3} - 1)^2$  ثم حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (I). نسمي

$z_1$  و  $z_2$  حلي هذه المعادلة حيث  $|z_1| > |z_2|$  ب - أكتب  $z_1$

و  $z_2$  على الشكل المثلثي ثم استنتج كتابة العدد المركب  $z_1 \cdot z_2$  على

الشكل المثلثي ج - استنتج قيمة  $\cos \frac{5\pi}{12}$  و  $\sin \frac{5\pi}{12}$

(2) عين قيم العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون  $\left(\frac{z_1 \cdot z_2}{2\sqrt{2}}\right)$  عددا حقيقيا

### تمرين 03

ليكن  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  حيث  $r \in \mathbb{R}_+^*$  و  $\theta \in [0; 2\pi]$

(1) احسب  $z^2$  و  $(1+i) \times \bar{z}$  بدلالة  $r$  و  $\theta$ .  $(\bar{z})$  مرافق  $z$

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة:  $z^2 = (1+i)\bar{z}$

### تمرين 04

(1) أوجد الجذور من الرتبة الرابعة للعدد 1

(2) أ - أنشر و بسط:  $(z-1)(z^3 + z^2 + z + 1)$

ب - حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^3 + z^2 + z + 1 = 0$

(3) نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$ :  $(z-2i)^4 = -4$  (\*)

أ - تحقق أن  $(1+i)$  هو حل للمعادلة (\*) ب - حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (\*)

### تمرين 05

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (\*)

$$2(1+i)z^2 + 2(\lambda+i)z + i\lambda(1-i) = 0 \text{ حيث } \lambda \text{ عدد}$$

مركب طويلته  $r$  و عمدته  $\theta$

(2) حدد  $r$  و  $\theta$  لكي يكون  $z_1$  و  $z_2$  متعاكسان (نرمز بـ  $z_1$  إلى

الجذر المستقل عن  $\lambda$  و  $z_2$  الجذر الآخر).

(3) نفرض أن:  $\lambda = 1-i$  و  $A, B, M$  هي صور الأعداد

المركبة  $z_1$  و  $z_2$  و  $z$  على الترتيب - عين مجموعة النقط

$M(z)$  حتى يكون المثلث  $AMB$  قائم في  $B$



### تمرين 06

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس التحويل  $T$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$  حيث :

$$z - 2 = (1 + i\sqrt{3})^n \cdot z' \quad \text{إذا كان } n = 1 . \text{ ما طبيعة التحويل}$$

$T$  و ما هي عناصره المميزة ؟ (2) عين العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون التحويل  $T$  تحاكي.

### تمرين 07

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $i^5 = 1$  ، تعطى الحلول على الشكل المثلثي .

(2) برهن أن مجموع الحلول يساوي 0 .

$$(3) \text{ استنتج أن : } \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}$$

$$(4) \text{ عبر عن } \cos \frac{4\pi}{5} \text{ بدلالة } \cos \frac{2\pi}{5} \text{ ثم احسب } \cos \frac{2\pi}{5} \text{ و } \cos \frac{4\pi}{5} .$$

### تمرين 08

باستعمال دستور موافر احسب :

$$\sin 4x \text{ و } \cos 4x \text{ بدلالة } \sin x \text{ و } \cos x .$$

### تمرين 09

ليكن كثير الحدود  $P(z)$  المعروف في  $\mathbb{C}$  بـ :

$$P(z) = az^3 + bz^2 + cz \quad \text{حيث : } a, b, c \text{ أعداد مركبة .}$$

$$(1) \text{ عين } a, b, c \text{ علما أن : } P(1) = -2 + i \text{ و } P(i) = -1 - 2i$$

$$(2) \text{ تأخذ القيم التي وجدت في السؤال السابق .}$$

حل المعادلة  $P(z) = 0$  في المستوي المركب المنسوب إلى

معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  نعتبر النقط  $O, B, A$  ذات

الواحد على الترتيب  $0, 2, -1 + i$  . عين لاحقة النقطة  $C$  حتى يكون الرباعي  $AOBC$  متوازي الأضلاع.

### تمرين 10

$$(1) \text{ حل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة : } z^2 - (4 + 3i\sqrt{3})z + 4 + 6i\sqrt{3} = 0 \dots (*)$$

ليكن  $z_1$  و  $z_2$  حلا المعادلة (\*) حيث  $M_1, M_2, M_3 \in \mathbb{R}$

نقط من المستوي المركب لواحقها على الترتيب  $z_1, z_2$  ،

$$(2) \text{ حدد عناصر التشابه المباشر بحيث } -7 + 6i\sqrt{3}$$

$$S(M_1) = M_2 \text{ و } S(M_2) = M_3 \text{ (3) عين لاحقة } G \text{ مركز}$$

$$\text{ثقل المثلث } M_1 M_2 M_3 .$$

### تمرين 11

نريد حل في المجموعة  $\mathbb{C}$  المعادلة (e) :

$$(e) : z^4 - (1 + i\sqrt{5})z^3 + (2 + i\sqrt{5})z + 1 = 0$$

(1) - برهن أن  $z$  هو حل للمعادلة (e) إذا و فقط إذا كان :

$$\alpha = z + \frac{1}{z} \text{ هو حل للمعادلة (E) :}$$

$$\alpha^2 - (1 + i\sqrt{5})\alpha + i\sqrt{5} = 0$$

ب - حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (E) واستنتج حلول المعادلة (e).



(2) في المستوي المركب نعتبر النقط  $A, B, C, D$  التي لواحقتها على الترتيب  $z_A = \left(\frac{\sqrt{5}-3}{2}\right)i, z_B = \left(\frac{\sqrt{5}+3}{2}\right)i$

$$z_D = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, z_C = \frac{1-i\sqrt{3}}{2} \text{ عين العبارة المركبة}$$

للتحاكي  $h$  بحيث:  $h(A) = C, h(B) = D$

### تمرين 12

يعطى العدد المركب  $\alpha$  حيث:  $\alpha = \sqrt{2-\sqrt{2}} - i\sqrt{2+\sqrt{2}}$   
(1) احسب  $\alpha^2$  و  $\alpha^4$  (2) أكتب  $\alpha^4$  على الشكل المثلثي ثم استنتج من ذلك طول  $\alpha$  و عمدته (2) نعتبر المستوي  $(\pi)$  المزود بمعلم متعامد و متجانس ، نرفق بكل نقطة  $M(x; y)$  بلاحتها  $z$  عين مجموعة النقط  $M$  من  $(\pi)$  بحيث:  $|\alpha z| = 8$

### تمرين 13

(1) أكتب على الشكل المثلثي العدد المركب  $(-1-i)$

$$(2) \text{ حل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة : } \frac{(-1-3i)z+3+i}{z-i} = z$$

نرمز بـ  $z_0$  للحل الذي له أصغر طول (3) أ- احسب  $\left(\frac{z_0}{\sqrt{2}}\right)^{1984}$  و أكتبه على الشكل الجبري. ب- ما هي قيم العدد الطبيعي  $n$  التي

من أجلها يكون العدد المركب  $\left(\frac{z_0}{\sqrt{2}}\right)^n$  عددا حقيقيا .

### تمرين 14

نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  العدد

$$\text{المركب } f(z) = \frac{(4-6i)z+1+3i}{2z-1-i}$$

(1) بوضع  $z = x + iy$  أكتب  $f(z)$  على الشكل الجبري.

(2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $f(z) = 2z$  . نرمز لحلي المعادلة بـ  $z'$  و  $z''$  بحيث  $|z'| > |z''|$  (3) أ- احسب طول  $z'$  و عمدة العدد المركب  $z' - 2iz''$  . ب- أوجد مجموعة قيم العدد الطبيعي  $n$  التي من أجلها يكون العدد  $(z' - 2iz'')^n$  حقيقيا .

### تمرين 15

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :

$$(iz-1)[z^2-(1+4i)z-(5+i)]=0 \quad \dots (E)$$

يرمز بـ  $z_0, z_1, z_2$  إلى حلول المعادلة (E) بحيث :

$$|z_0| < |z_1| < |z_2| \quad (2) \text{ المستوي } (\pi) \text{ مزود بمعلم متعامد}$$

ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  . لكان النقط  $A, B, C, M$  من

المستوي  $(\pi)$  التي لواحقتها  $z_0, z_1, z_2, z$  على الترتيب .

أ- أوجد إحداثيات النقطة  $G$  مرجعا للنقط  $A, B, C$  المرفقة بالمعاملات 1, 2, 1 على الترتيب .



ب- احسب  $GA$  ،  $GB$  ،  $GC$  . ج- عين مجموعة النقط  $M$

$$\text{بحيث: } |z - z_0|^2 + 2|z - z_1|^2 + |z - z_2|^2 = 34$$

### تمرين 16

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 - (7 + 3i)z + 10 + 10i = 0$  نرسم

لحلي المعادلة ب :  $z_1$  ،  $z_2$  بحيث :  $|z_1| < |z_2|$  (2) - احسب

طويلة العدد المركب  $(z_1 \times z_2)$  و عمدته . ب - عين قيم  $n$  حتى

يكون  $(z_1 \times z_2)^n$  عددا تخيليا صرفا مع  $100 < n < 130$  .

(3) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \bar{i}; \bar{j})$  .

$A$  ،  $B$  صورتا  $z_1$  ،  $z_2$  على الترتيب ،  $C$  النقطة التي

إحداثياتها  $(0; 2)$  . - عين مركز ونسبة و زاوية التشابه المباشر

$S$  الذي يحقق  $S(A) = B$  و  $S(C) = O$  .

### تمرين 17

نعتبر العددين المركبين  $z_1$  ،  $z_2$  حيث :

$$z_1 = 2 + 2i \text{ ، } z_2 = 1 - i\sqrt{3}$$

(1) أكتب  $z_1$  و  $z_2$  على الشكل المثلثي . (2) في المستوي المركب

المزود بمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \bar{i}; \bar{j})$  نعتبر النقطتين  $A$  ،  $B$

اللتين لاحقتاهما على الترتيب  $z_1$  و  $z_2$  . الدوران  $R$  الذي مركزه

النقطة  $O$  و زاويته  $\frac{5\pi}{6}$  يحول النقطة  $A$  إلى النقطة  $C$  .

أ- عين  $z_3$  لاحقة  $C$  هي  $z_3 = -(1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i$

ب- برهن أن حاصل القسمة  $\frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2}$  هو عدد تخيلي صرف . -

احسب طويلته و عمدته هذا الحاصل . - فسر هندسيا هذه الناتج مع  
تعيين طبيعة المثلث  $ABC$  .

### تمرين 18

ليكن  $f$  التطبيق من  $\mathbb{C} - \{2i\}$  نحو  $\mathbb{C}$  المعروف ب :

$$f(z) = \frac{2z - i}{z - 2i} \quad (1) \text{ - حل المعادلة } f(z) = z$$

ب- أكتب  $z_1$  و  $z_2$  حلول المعادلة على الشكل الجبري و المثلثي .

ج- احسب العدد  $z_1^4 + z_2^4$  .

(2) نرسم  $M(x; y)$  إلى صورة العدد المركب  $z$  في المستوي

المركب المزود بمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \bar{i}; \bar{j})$  . ليكن  $(\Gamma)$

مجموعة النقط  $M$  بحيث يكون  $f(z)$  تخيليا صرفا . أوجد

معادلة  $(\Gamma)$  . (3) برهن أن طويلة  $z$  هي 1 إذا و فقط إذا كانت

طويلة  $f(z)$  هي 1 .

### تمرين 19

حل في  $\mathbb{C}^2$  الجملتين :

$$(1) \begin{cases} z_1^2 + z_2^2 = 2 \\ z_1 \cdot z_2 = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} z_1 + 2z_2 = i \\ z_1 \cdot z_2 = 1 \end{cases}$$



## تمرين 20

نعتبر العدد المركب  $z = 1 + \cos \theta - i \sin \theta$  حيث  $\theta \in [0; 2\pi]$  احسب بدلالة  $\theta$  طولية و عمدة العدد المركب

$$z \text{ و } z' = \frac{1}{\bar{z}} \text{ ( } \bar{z} \text{ هو مرافق } z \text{ )}$$

## تمرين 21

ليكن كثير الحدود :

$$P(z) = z^4 - 8(1+i)z^3 + 48iz^2 + 64(1-i)z - 80$$

1- أ) برهن أن المعادلة  $P(z) = 0$  تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$  وجذرا تخيليا صرفا  $z_1$  يطلب تعيينهما .

ب) عين العدد ين الحقيقيين  $a$  و  $b$  بحيث :

$$P(z) = (z - z_0)(z - z_1)(z^2 + az + b)$$

2) حل المعادلة  $P(z) = 0$  في المستوى المزود بمعلم متعامد ومتجانس نعتبر النقط  $A(2; 0)$  ،  $B(0; 2)$  ،  $C(2; 4)$  ،  $D(4; 2)$  .

$R$  هو الدوران الذي مركزه  $A$  وزاويته  $\frac{\pi}{2}$  ، عين عبارة الدوران

$R$  ثم تحقق أن  $R(D) = B$  .

## تمرين 22

نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة التالية حيث  $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  .

$$z^2 - (1 + \cos \theta)iz - (1 + \cos \theta) + (1 - \cos \theta)i = 0 \dots (*)$$

1- أ) تحقق أن  $z_0 = 1 + i \cos \theta$  هو حل للمعادلة (\*) .

ب) استنتج الجذر الآخر  $z_1$  .

2- أ) احسب  $(z_0 + z_1)^4$  .

ب) عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $(z_0 + z_1)^n \in \mathbb{R}$  .

3) في المستوى المزود بمعلم متعامد ومتجانس ، نعتبر التحويل

$T$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$  حيث :

$$z' = (\sin \theta + i \cos \theta)z + (1 - \cos \theta)i$$

- ما طبيعة التحويل  $T$  ، وما هي عناصره المميزة .

## تمرين 23

باستعمال القانونين لأولار (Euler) :

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ و } \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

أكتب على شكل عبارة خطية ما يلي :

$$\sin^2 x \cdot \cos^4 x \quad (1) \quad \sin x \cdot \cos^3 x \quad (2)$$

## تمرين 24

1) عين العددين الحقيقيين  $x$  و  $y$  حيث :  $(x + iy)^2 = 8 + 6i$  .

2) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $iz^2 + (1 - 3i)z - (3 - 4i) = 0$  .

3- أ) برهن أن المعادلة :

$$iz^3 + (1 - 5i)z^2 - (5 - 10i)z + 2(3 - 4i) = 0 \dots (*)$$

تقبل جذرا حقيقيا  $z_0$  يطلب تعيينه . ب) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة (\*)



نرمز بـ  $z_0, z_1, z_2$  إلى حلول المعادلة (\*) حيث :

حقيقي  $(z_2)$  أكبر من حقيقي  $(z_1)$ .

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ، نعتبر النقاط

$A, B, C$  ذات اللواحق على الترتيب  $z_0, z_1, z_2$ .

(1) برهن أن المثلث  $OBC$  هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين.

(2) عين لاحقة  $D$  لكي يكون الرباعي  $OBCD$  مربعا .

### تمرين 25

نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  :

$$(*) \dots (z + 1 - 3i)[z^2 + (-4 + i)z + 4 - 2i] = 0$$

(1) حل هذه المعادلة علما أنها تقبل حلا حقيقيا.

(2) مثل في مستوي الأعداد المركبة النقاط  $A, B, C$  صور

$z_0, z_1, z_2$  حلول المعادلة (\*).

(3) عين لاحقة النقطة  $G$  مركز ثقل المثلث  $ABC$ .

(4) عين مجموعة النقاط  $M(z)$  حيث :

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = K \text{ (ناقش حسب العدد الحقيقي } K \text{)}$$

### تمرين 26

$$L = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} + i \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$$

(1) أ - احسب  $L^2, L^4$  . ب - اكتب  $L^4$  على الشكل المثلثي .

(2) أ - استنتج طولية و عمدة  $L$  . ب - عين  $\cos \frac{\pi}{12}$  و  $\sin \frac{\pi}{12}$ .

(3) عين العدد الطبيعي  $n$  لكي يكون  $L^n$  حقيقيا .

### تمرين 27

$$L = \frac{\bar{z} + 2 + i}{1 - i\bar{z}} \text{ حيث } \bar{z} \text{ هو مرافق } z.$$

(1) اوجد العدد المركب  $z$  بحيث  $L = 1 + i$ .

(2) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، لتكن النقطة  $M$  التي لاحتقتها  $z = x + iy$  . أ) اكتب  $L$  على الشكل الجبري .

ب) عين المجموعة  $(\gamma)$  مجموعة النقاط  $M(z)$  بحيث  $L$  يكون

عددا حقيقيا. ج) عين مجموعة النقاط  $M(z)$  بحيث  $|L| = 2$ .

### تمرين 28

نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  المتتاليتين  $(S_n)$  و  $(L_n)$  المعرفتين بـ :

$$S_0 = 1 \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n :$$

$$S_{n+1} = (1 + i\sqrt{3})S_n + 3 \text{ و } L_n = S_n - i\sqrt{3}$$

(1) برهن أن المتتالية  $(L_n)$  هندسية يطلب تعيين حدها الأول

وأساسها  $q$ .

(2) عبر عن  $L_n$  و  $S_n$  بدلالة  $n$ .

(3) نعتبر التحويل  $T$  الذي يوافق بكل نقطة  $M$  ذات اللاحقة


$z$  النقطة  $M'$  ذات اللاحقة  $z'$  حيث :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + (1 - i\sqrt{3})$$

(أ) ما طبيعة التحويل  $T$  ؟ . ب) عين العناصر المميزة للتحويل  $T$ .



فربج اخرج لي حدرى و بصر لي امرى و احل معقدة من  
لمايى يفتقوا قولى



تمرين 29  
نعتبر الدالة  $f$  المعرفة ب :

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto f(z) = \frac{z}{1+iz}$$

حيث :  $z \in \mathbb{C} - \{i\}$ .

1- (أ) حل المعادلة  $f(z) = \frac{1}{z}$  وليكن  $z'$  ،  $z''$  جذري هذه المعادلة

حيث  $R(z') > 0$  و  $z''$  الحلا الآخر. (ب) أكتب  $z'$  ،  $z''$  على الشكل  
المثلثي. (ج) أحسب  $(z')^6 + (z'')^6$ .

(2) أثبتان  $f(z)$  يكون تخيليا صرفا إذا وفقط إذا كان  $z$  تخيليا صرفا

تمرين 30

(1) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^2 - (5 + i\sqrt{3})z + 4 + 4i\sqrt{3} = 0$

2- (أ) أكتب الجذرين على الشكل المثلثي.  
(ب) استنتج حلول المعادلة.


$$z^4 - (5 + i\sqrt{3})z^2 + 4 + 4i\sqrt{3} = 0 \quad (*)$$


لتكن  $N_1$  ،  $N_2$  ،  $N_3$  ،  $N_4$  صور حلول المعادلة (\*) في معلم  
متعامد ومتجانس.


(3) ما طبيعة الرباعي  $N_1 N_4 N_2 N_3$  ؟



## المفهرس

5.....الملخص 

9.....تمارين محلولة 

95.....تمارين مرفقة بالحل 

122.....تمارين مقترحة للحل 

136 .....الفهرس •


الرجاء الدعاء لمؤلف الكتاب  
و الدعاء للوالد الكريم - رحمه الله -

وفق الله الجميع


Scanned by : Mekkaoui Ayoub  
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr



# في نفس السلسلة



Scanned by : Mekkaoui Ayoub  
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr



ISBN : 978-9947-0-1864-4